Rødspætte

Latinsk navn: **Pleuronectes platessa**
Engelsk navn: **European plaice**
Tysk navn: **Scholle**
Svensk navn: **Rödspätta**
Norsk navn: **Rødspette**
Klasse: **Fisk**
Orden: **Højrevendte fladfisk**
Familie: **Rødspættefamilien**

Rødspætten er almindelig i alle de danske farvande, hvor den lever fra ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken foretrækker sandbund eller den bløde, blandede bund, hvor den kan grave sig ned. Rødspætter søger ud på dybere vand om vinteren.

Kendetegn

Rødspætter er højrevendte fladfisk, hvilket vil sige, at begge øjne og gælleåbningen sidder på den højre side. Rødspættens højre side er gråbrun eller brunlig med karakteristiske runde rødlige pletter. Farven kan dog variere. Venstresiden er hvid. Fisken er glat med nogle vortede benknuder på gællelåget.

Føde

Rødspættens føde består af mindre muslinger, krebsdyr, orme og småfisk. Rødspætterne søger normalt føde om natten.



Fakta
Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 100 cm
Vægt: Op til ca. 7 kg
Æg: Op til 500.000
Gyder: Januar-marts
Bliver kønsmoden efter 2-5 år

Vidste du det?
Rødspætter gyder ved bunden, hvorefter æggene flyder op til overfladen. Ynglen lever frit i vandet de første par uger. Så forvandles larverne til højrevendte fladfisk, hvor begge øjne er vokset over på den samme side. Herefter søger de små rødspætter ned mod bunden.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2026 Jørgen Steen, StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne