



# Småpletet rødhaj

Latinsk navn: *Scyliorhinus caniculus*

Engelsk navn: Smallspottet catshark

Klasse: Fisk

Orden: Blinkhindehajer

Familie: Scyliorhinidae



**D**en småplettede rødhaj er ret almindelig i Skagerrak, Nordsøen og Kattegat indtil Øresund og Bælterne. Hajen foretrækker sand-, grus- og mudderbund samt dybder på 10-100 meter, men kan dog optræde helt ned til 400 meters dybde. Rødhajen jager om natten over bunden eller i de frie vandmasser.

## Kendetegn

Småpletet rødhaj er en lille, slank og langstrakt haj med en kort og bred snude og store øjne. Hajen er sandfarvet eller brunlig med nogle mørke eller rødlig pletter. Bugen er lys. Desuden er rødhajen meget ru, da den er dækket af små bentorne i stedet for skæl.

## Føde

De småplettede rødhajer finder især deres føde på bunden. Føden består af snegle, rejer, søstjerner, blæksprutter, hummere og småfisk.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: op til 100 cm

Vægt: ?

Ægkapsler: 15-20

Parring: Efterår

Bliver kønsmoden ved en

længde på ca. 50 cm



Max levealder: ?

### Vidste du det?

Modsat mange andre fisk, sker der hos småplettede rødhajer en egentlig parring. Derefter gyder hunnen sine æg på bunden, hvor de sætter sig fast i tang og sten med nogle lange tråde. Æggene ligger inde i nogle gulbrune ægkapsler. Æggene klækkes efter 5-11 måneder, og ungerne er ca. 10 cm lange.




## Tegn en småplettet rødhaj





## Den småplettede rødhajs føde



## Fortæl om den småplettede rødhaj

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---