



Almindelig ryle

Latinsk navn: *Calidris alpina*
Engelsk navn: Dunlin
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle


Almindelig ryle er en almindelig trækfugl, der kan ses ved de danske kyster og især i Vadehavet forår-efterår. Enkelte ryler overvintrer i Danmark. De lever ved lavvandede kyster, på fugtige strandenge eller på åbne vadeblader. Kun få par yngler i Danmark, men alligevel er rylen, den mest almindelige vade-fugl i Danmark.

Kendetegn

Den almindelige ryle er en lille fugl med et langt, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har fuglen en mere gyldenbrun overside med mørke pletter samt et mørkt bugskjold på undersiden.

Føde

Almindelig ryle lever af forskellige smådyr som insekter, bløddyr, krebsdyr, orme og larver.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 32-40 cm
Længde: 17-21 cm
Vægt: 40-50 g
Kuld størrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 19-21 dage

Vidste du det?

Almindelig ryle søger føde på vadeblader, i strandkanter eller på sand- og mudderbanker, hvor fuglen borer sit næb 1-2 cm ned i bunden. Rylerne søger normalt efter føde i flokke på flere tusinde fugle.