



Almindelig ryle


Latinsk navn: *Calidris alpina*

Engelsk navn: **Dunlin**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Snepefugle**



Almindelig ryle er en trækgæst, der kan ses ved de danske kyster og især i Vadehavet forår-efterår. Enkelte ryler overvintrer i Danmark. Rylerne lever ved lavvandede kyster, på fugtige strandenge eller på åbne vade-flader. Kun få par yngler i Danmark. Til gengæld er rylen den mest almindelige vadefugl herhjemme.

Kendetegn

Almindelig ryle er en lille fugl med et langt, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har den en mere gyldenbrun overside med mørke pletter samt et mørkt bugskjold på undersiden.

Føde

Almindelig ryle lever af forskellige smådyr som insekter, bløddyr, krebsdyr, orme og larver.

Fakta



Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 32-40 cm
Længde: 17-21 cm
Vægt: 40-50 g
Maks. levealder: 28 år
Kuld størrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 19-21 dage

Vidste du det?

Almindelig ryle søger føde på vade-flader, i strandkanter eller på sand- og mudderbanker, hvor fuglen borer sit næb 1-2 cm ned i bunden. Rylerne søger normalt efter føde i flokke på flere tusinde fugle.




Tegn en almindelig ryle





Almindelig ryles føde



Fortæl om almindelig ryle
