



Bjergand


Latinsk navn: *Aythya marila*

Engelsk navn: Greater scaup

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Bjerganden ses i Danmark som træk- og vintergæst. Hovedparten af de bjergænder, der overvintrer i Danmark, kommer fra Rusland. De største koncentrationer af overvintrende bjergænder findes i Lillebælt og Ålborg Bugt. Bjerganden kan også ses i søer.

Kendetegn

Bjerganden ligner troldanden, men mangler troldandens nakketop. Hannen har lysegrå ryg i modsætning til troldandens sorte ryg, mens hunnen har et stort, hvidt parti ved næbroden.

Føde

Bjerganden lever i sær af muslinger, som den finder ved at dykke. Derudover tager den også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 72-84 cm
Længde: 48 cm
Vægt: 700-1.100 g
Kuld størrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 40-45 dage

Vidste du det?

Store flokke af bjergænder, som tidligere overvintrede i det sydlige Danmark, er nu flyttet til IJsselmeer i Holland, hvor de især lever af den invasive vandremusling.