Blåhals

Latinsk navn: **Luscinia svecica**
Engelsk navn: **Bluethroat**
Tysk navn: **Blaukelchen**
Svensk navn: **Blåhake**
Norsk navn: **Blåstrupe**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Spurvefugle**
Familie: **Smådrosler og fluesnappere**

Blåhals findes i to racer i Danmark. En sydlig art, som yngler i Sydvestjylland og en nordlig art, som ses på træk gennem Danmark. Blåhalsen yngler i tæt krat eller tagrør langs grøfter og i våde enge.

Kendetegn

Blåhalsen kendes især på den lysende blå hals. Den nordlige art har en rød plet på struben, mens den sydlige art har en hvid plet midt på struben.

Føde

Blåhalsen lever mest af småinsekter som biller, myg og fluer samt larver og små snegle, men de æder også frø, bær og frugt.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 20-22,5 cm
Længde: 13-14 cm
Vægt: 15-23 g
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 14 dage

Vidste du det?

De sydlige blåhalse flyver om efteråret sydpå til Middelhavs-området eller den afrikanske savanne. De nordlige blåhalse kommer på træk fra Skandinavien og flyver mod mod sydøst.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2026 Jørgen Steen, Naturporten.dk · StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne