



Dobbeltbökkasin

Latinsk navn: *Bucephala clangula*
Engelsk navn: Common goldeneye
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle



Dobbeltbökkasinen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i marts og trækker bort igen i november. Den overvintrer i Vesteuropa eller Nordvestafrika. Dobbeltbökkasinen er almindelig i hele landet, men den yngler helst i fugtige områder som enge eller ved søer og moser. Rederne skjules i fordybninger i græs.

Kendetegn

Dobbeltbökkasinen er en vadefugl med et meget langt næb, der udgør 1/3 af den samlede længde. Fjerdragten er brunlig med gyldne, lyse striber på ryggen, og halen er afrundet. De yderste halefjer er lyse.

Føde

Det meget lange næb anvendes til at finde føde i jorden. Føden består mest af regnorme, biller, snegle og insekter.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 37-47 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 80-120 g
Kuld størrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-20 dage
Ungetid: 19-20 dage

Vidste du det?

Dobbeltbökkasinen er svær at få øje på i naturen, fordi den kan skjule sig godt i omgivelserne. Under parringsflugten dykker dobbeltbökkasinen med en så høj fart, der sætter de yderste halefjer svingninger. Disse svingninger frembringer en lyd, der lyder som en fjern trommen.