



Engpiber


Latinsk navn: Anthus pratensis
Engelsk navn: Jackdaw
Klasse: Meadow pipit
Orden: Spurvefugle
Familie: : Vipstjerte og pibere
Orden: Spurvefugle



Engpiberen træffes i det meste af Danmark, især på enge og overdrev. De fleste engpibere findes på de store strandenge i Vestjylland. Den danske bestand har haft en svag tilbagegang de seneste årtier, især fra Midt- og Østjylland. Engpiberens rede bygges på jorden ved en lille tue.

Føde

Engpiberens føde består især af forskellige insekter, suppleret med frø i vinterhalvåret.



Kendetegn

Engpiberen er en lille stribet og plettet brunlig fugl. Benene er rødlige og bugen er lys.

Fakta

Levesteder: Enge, strandenge
Vingefang: 22-25 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-25 g
Kuld størrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 13-14 dage

Vidste du det?

De fleste engpibere, som ses i Danmark, er trækfugle der om vinteren holder til i Vest- og Sydeuropa. Mange østdanske lokaliteter besøges i træktiden desuden af skandinaviske fugle, der overvintrer i det Sydvestlige Jylland.