



Engpiber

Latinsk navn: **Anthus pratensis**

Engelsk navn: **Jackdaw**

Tysk navn: **Wiesenpieper**

Svensk navn: **Ängsplingärka**

Norsk navn: **Heipiplerke**

Klasse: **Meadow pipit**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Vipstjerne og pibere**


Orden: **Spurvefugle**

Engpiberen træffes i det meste af Danmark, især på enge og overdrev. De fleste engpibere findes på de store strandenge i Vestjylland. Den danske bestand har haft en svag tilbagegang de seneste årtier, især fra Midt- og Østjylland. Engpiberens rede bygges på jorden ved en lille tue.



Føde

Engpiberens føde består især af forskellige insekter, suppleret med frø i vinterhalvåret.



Kendetegn

Engpiberen er en lille stribet og plettet brunlig fugl. Benene er rødlige og bugen er lys.

Fakta

Levesteder: Enge, strandenge

Vingefang: 22-25 cm

Længde: 14 cm

Vægt: 16-25 g

Kuld størrelse: 4-5 æg

Antal kuld: 2

Rugetid: 13-14 dage

Ungetid: 13-14 dage

Vidste du det?

De fleste engpibere, som ses i Danmark, er trækfugle der om vinteren holder til i Vest- og Sydeuropa. Mange østdanske lokaliteter besøges i træktiden desuden af skandinaviske fugle, der overvintrer i det Sydvestlige Jylland.