



Fyrremejse

Latinsk navn: **Regulus regulus**

Engelsk navn: **Willow tit**

Tysk navn: **Weidenmeisen**

Svensk navn: **Talltita**

Norsk navn: **Granmeis**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Mejser**

Fyrremejsen er en lille mejseart i spurvefamilien, som især er knyttet til nåleskove. Fyrremejsen er overvejende standfugl, men strejfer mere uden for yngletiden end sumpmejsen, som den ofte forveksles med. Den lever i skovens mellemste lag, hvor den gennemgår grenene efter føde. I Danmark er den en forholdsvis ny ynglefugl, som indvandrede i 1980'erne, og den har siden har spredt sig nordpå fra Sønderjylland.

Kendetegn

Fyrremejsen bliver omkring 11,5 cm lang og virker tæt med forholdsvis stort hoved og tyk hals. Oversiden af fjerdragten er grå til brunlig, undersiden gråhvid med en sort "hagesmæk", og på hovedet har fuglen en mat, sort hætte og hvidlige kinder.

Føde

I yngletiden består føden mest af insekter og edderkopper. Resten af året skifter den til frø og planteføde. Den gemmer ofte frø i barkrevner og mos til senere på året.



Fakta

Levesteder: Nåleskove
Vingefang: 17-20 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Kuldstørrelse: 6-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 18 dage

Vidste du det?

Fyrremejse og sumpmejse ser meget ens ud, og de sikreste kendetegn er ofte stemmen og små forskelle i hovedformen og kindernes farve.