



# Rødben

Latinsk navn: *Tringa totanus*

Engelsk navn: Common redshank

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle

I Danmark findes både nordlige og sydlige rødben. De nordlige overvintrer i Danmark, mens de sydlige ankommer i marts og trækker væk igen til oktober. Rødben lever og yngler på enge langs søer og vandløb, ved moser samt på vadeblader ved kysten. De søger føde i mudder og på lavt vand.



## Kendetegn

Rødben har fået navn efter de lange orangerøde ben. Fuglen har en gråbrun ryg med mørke pletter samt en hvid underside. Det lige næb er sort og rødt. I yngletiden er rødbenens fjerdragt mørkere og med striber på undersiden. Når rødben flyver kan man desuden se de hvide vingekanter.

## Føde

Rødben tager især orme, muslinger, små krebsdyr og insekter.



### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav  
Vingefang: 45-52 cm  
Længde: 27-29 cm  
Vægt (han): 85-140 g  
Vægt (hun): 110-155 g  
Kuld størrelse: 4 æg  
Antal kuld: 1  
Rugetid: 24 dage  
Ungetid: 25-35 dage

### Vidste du det?

Rødbenen er en meget nervøs fugl, der er hurtig til at lette, hvis den bliver forstyrret eller føler sig truet. Samtidig med, at den er hurtig til at lette, udstøder den også høje og kraftige advarselslyde.