



Rødhovedet and

Lastinsk navn: **Netta rufina**

Engelsk navn: **Red-crested pochard**

Tysk navn: **Kolbenente**

Svensk navn: **Rödhuvad dykand**

Norsk navn: **Rødhodeand**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Andefugle**

Familie: **Svaner, gæs, ænder**



Rødhovedet and er sjælden i Danmark, fordi dens vigtigste udbredelsesområde ligger øst og syd for landet. Tidligere var der en fast lille bestand i Danmark, men de forsvandt i takt med at mange vådområder blev tørlagte. Enkelte ynglende par har dog genetableret sig på Lolland ved Maribosøerne.

Kendetegn

Rødhovedet and kendes især på hannens røde næb og orangerøde hoved. Hunnen har en lys, brun fjerdragt, grå kinder og et mørkt område øverst på hovedet.

Føde

Rødhovedet and æder især vandplanter og alger, som den finder i vandoverfladen.

Fakta

Vingefang: 84-88 cm

Vægt 1.000 - 1.300 gram

Længde: 56 cm

Kuld: 1 kuld på 8-11 æg

Rugetid: 26-28 dage

Ungetid: 45-50 dage

Vidste du det?

Bestanden af rødhovedet and er i fremgang i Danmark, hvilket sandsynligvis skyldes, at der er nu er skabt flere lavtvandede vådområder og søer, hvor jorden tidligere blev dyrket.