



# Silkehale

Latinsk navn: *Bombycilla garrulus*  
 Engelsk navn: *Bohemian Waxwing*  
 Klasse: **Fugle**  
 Orden: **Spurvefugle**  
 Familie: **Silkehaler**

Silkehalen er en almindelig træk- og vintergæst i Danmark i perioden fra midt oktober til hen i maj. Arten forekommer i storbyer med bærbuske og -træer. Antallet af silkehaler i Danmark varierer meget fra år til år afhængigt af fødemængden i yngleområderne. I nogle år forekommer Silkehaler i store invasioner. Silkehaler yngler i det nordligste Skandinavien og Sibirien fra midt maj til midt juli.

## Kendetegn

Silkehalen er en særegen, lysebrun spurvefugl med nakketop, sort maske ved øjnene og sort hagesmæk. Arten har blålig hale med gult halebånd samt røde, gule og hvide felter i vingerne. Kaldet lyder som små klokker, der ringer.

## Føde

Silkehaler lever hovedsageligt af bær, især rønnebær. I yngletiden består føden også af insekter.



### Fakta



Levesteder: Skoven, Det åbne land  
 Vingefang: 32-35,5 cm  
 Længde: 18 cm  
 Vægt: 40-70 g  
 Maks. levealder: 5 år  
 Kuld størrelse: 4-6 æg  
 Antal kuld: 1  
 Rugetid: 13-14 dage  
 Ungetid: 15-17 dage

### Vidste du det?

Flokke af silkehaler er kendt for at kunne plyndre rønnebærtræer- og buske på minutter. Silkehalen har en særlig stor lever, der gør, at den kan omsætte og forbrænde alkoholen i gærede bær uden at blive beruset.



Tegn en  
silkehale





## Silkehalens føde



## Fortæl om silkehale

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---