



Skkestork

Latinsk navn: **Platalea leucorodia**

Engelsk navn: **Spoonbill**

Tysk navn: **Löffler**

Svensk navn: **Skedstork**

Norsk navn: **Skjestork**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Pelikanfugle**

Familie: **Ibisser**

Skkestorken er ikke en stork, men nært beslægtet med ibiser, og kendetegnes ved at danne ynglekolonier i vådområder. De største danske kolonier findes ved Limfjorden, i Skjern Å dalen og ved Ringkøbing Fjord, men der er også mindre kolonier enkelte steder i det øvrige land.

Kendetegn

Fjerdragten er hvid, men voksne fugle har en svagt gullig halsring. I yngletiden har skkestorkene en gullig fjerdusk i nakken. Næbbet er langt, fladt og bredt med en skeformet spids, det er gråsort med en gul spids. Benene er lange og sorte.

Føde

Føden består mest af småfisk, haletudser, vandinsekter, snegle og små krebsdyr samt bunddyr.



Fakta

Vingefang: 115-130 cm

Længde: 86 cm

Vægt: 1.200-1.700 g

Kuld: 1 kuld på 3-5 æg

Rugetid: 24-25 dage

Ungetid: 45-50 dage

Vidste du det?

Skkestorke søger føde på lavt vand, hvor de svinger det skeformede åbne næb fra side til side gennem vandet. I næbbets spids sidder føleorganer, som registrerer små bevægelser. Når næbbet rammer et byttedyr, klapper det hurtigt i.