



Sortklire

Latinsk navn: *Tringa erythropus*

Engelsk navn: Spotted redshank

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle

Sortkliren er almindelig som trækfugl i Danmark. Den kan ses på træk i april-maj, hvor fuglene også fælder deres fjer, og igen i juni-november. Fuglen lever på lavvandede vadeblader langs kysterne. Rigtig mange fugle raster i Vadehavet. Sortkliren yngler ikke i Danmark, men nordpå i andre skandinaviske lande samt Rusland og Sibirien.

Kendetegn

I yngledragten er sortkliren helt sort med hvidlige pletter på oversiden samt hvid gump og hale. Om vinteren er fuglen mere lysegrå med hvid underside. Sortkliren har rødlige ben og et spinkelt, langt rødt og sort næb.

Føde

Sortkliren er en svømmefugl, der lever af vandinsekter, krebsdyr, bløddyr, orme, frøer, haletudser og småfisk, som den finder på lavt vand eller i mudderbunden.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 48-67 cm

Længde: 29-32 cm

(heraf udgør næbbet ca. 5-6 cm)

Vægt (han): 135-170 g

Vægt (hun): 160-205 g

Kuld størrelse: 3-4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: ca. 22-25 dage

Vidste du det?

Sortkliren yngler nordpå i skovområder med fugtige højmoser, hvor reden er en fordybning i jorden eller på en tue. Reden fores med plantedele. Alt tyder på, at hunnen kun bliver ved reden de første par dage efter æggene er lagt. Herefter er det hannen, der udruger æggene og passer og fodrer ungerne.