



Stenvender

Latinsk navn: *Arenaria interpres*

Engelsk navn: Turnstone

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle

Stenvenderen er en sjælden ynglefugl i Danmark, men den er ret almindelig som trækgæst i april-maj og juli-september. Stenvendere ses normalt alene eller i småflokke ved kyster med sten og sand. Nogle få fugle overvintrer i Danmark ved isfri kyster.

Kendetegn

I yngletiden er stenvenderen rødbrun og broget med sort bryst, hvid bug og sort-hvidt hoved med en hvid plet på hver side af næbbet. Om vinteren er stenvenderen gråbrun med hvid underside og sort bryst. Fuglen har desuden et kort, sort næb og korte, orange ben.

Føde

Stenvenderens føde består af tanglopper, insekter, bløddyr samt fiskerester og ådsler. Stenvenderen har fået sit navn, fordi den finder føden ved at skubbe sten væk med næbbet.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 43-49 cm
Længde: 21-24 cm
Vægt: 80-110 g
Kuld størrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 19-21 dage

Vidste du det?

I luften kan man kende stenvenderen på de tydelige hvide tegninger på oversiden af fjerdragten. Fuglen har en delvist hvid hale, markant hvid ryglinie, hvidt vingebånd samt smalle hvide tegninger mellem ryglinien og vingerne.