



Stenvender

Latinsk navn: *Arenaria interpres*

Engelsk navn: Turnstone

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Stenvender er en sjælden ynglefugl i Danmark, men den er ret almindelig som trækgæst i april-maj og juli-september. Stenvendere ses normalt alene eller i småflokke ved kyster med sten og sand. Nogle få fugle overvintrer i Danmark ved isfri kyster.

Kendetegn

I yngletiden er stenvenderen rødbrun og broget med sort bryst, hvid bug og sort-hvidt hoved med en hvid plet på hver side af næbbet. Om vinteren er stenvenderen gråbrun med hvid underside og sort bryst. Stenvenderen har desuden et kort, sort næb og korte, orange ben.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 43-49 cm

Længde: 21-24 cm

Vægt: 80-110 g

Maks. levealder: 21 år

Kuld størrelse: 4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 22-24 dage

Ungetid: 19-21 dage

Føde


Stenvenderens føde består af tanglopper, insekter, bløddyr samt fiskerester og ådsler. Stenvenderen har fået sit navn, fordi den finder føden ved at skubbe sten væk med næbbet.

Vidste du det?

I luften kan man kende stenvenderen på de tydelige hvide tegninger på oversiden af fjerdragten. Fuglen har en delvist hvid hale, markant hvid ryglinie, hvidt vingebånd samt smalle hvide tegninger mellem ryglinien og vingerne.



Tegn en stenvender





Stenvenderens føde



Fortæl om stenvender
