




Stormmåge

Latinsk navn: **Larus canus**
Engelsk navn: **Common gull**
Tysk navn: **Sturmmöve**
Svensk navn: **Fiskmås**
Norsk navn: **Fiskemåke**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Mågevadefugle**
Familie: **Måger**



Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger. Den træffes langs kyster og fjorde, hvor den yngler på små øer og holme. Stormmågen yngler også enkelte steder i indlandet, mest i åbne hedemoser. De fleste danske stormmåger overvintrer i Sydvesteuropa, mens de fugle man ser i Danmark om vinteren især stammer fra Østersøområdet. Antallet af stormmåger er faldet de seneste årtier, og det skyldes sandsynligvis ændringer i landbruget samt bedre udnyttelse af tilgængeligt affald i naturen og på lossepladser.

Føde

Stormmågen lever især af insekter og orme, som den finder på pløjemarken, samt af fisk og ådsler. Det er ofte store flokke af stormmåger man ser på markerne, når der pløjes og harves. Stormmågen finder også gerne føde på lossepladser, hvor de kan ses i stort tal.

Kendetegn

Stormmågen er en lille måge med en afrundet hovedform og det kort, spinkelt næb. Øjnene er forholdsvis store og sorte. Benene er gulgrønne om sommeren og mere mørke om vinteren.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav, åbent land
Vingefang: 106-125 cm
Længde: 41 cm
Vægt: 300-500 g
Kuld størrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-28 dage
Ungetid: 35-40 dage

Vidste du det?

Efter yngletiden samles den danske bestand af stormmåger i store flokke på steder med rigeligt føde. Her fuldfører de fældningen af fjerdragten i løbet af efteråret. Mange tusinde stormmåger, især fra Østersøområdet slutter sig til den danske flokke. I Vadehavet og Tøndermarsken er der registreret flokke på op til 100.000 fugle.