



# Vandstær

Latinsk navn: **Cinclus cinclus**

Engelsk navn: **White wagtail**

Tysk navn: **Wasseramsel**


Svensk navn: **Strömstare**

Norsk navn: **Fossefall**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Vandstære**



Vandstæren forekommer næsten udelukkende i Danmark om vinteren, hvor fugle nordfra trækker til landet. Vandstæren lever ved rene, stenede og hurtigstrømmende åer og vandløb. I Danmark er der kun registreret få vandstære som stand- og ynglefugle, hvilket skyldes ringe yngleforhold.

## Kendetegn

Vandstæren har en mørkegrå fjerdragt, der er mere brunlig på hovedet og bugen. Struben og brystet er skinnende hvidt. Halen er kort, mens benene er kraftige og lange.

## Føde

Vandstærens føde består af insektlarver, snegle, orme, tanglopper samt småfisk. Vandstæren finder føden ved at svømme mod strømmen eller gå på bunden af vandløbet.



## Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Vingefang: 25,5-30 cm

Længde: 18 cm

Vægt: 50-75 g

Kuld størrelse: 4-6 æg

Antal kuld: 2

Rugetid: 16 dage

Ungetid: 19-25 dage

## Vidste du det?

Vandstæren er særligt godt tilpasset til at lede efter føde på bunden af vandløb. Fjerdragten er tyk, hvilket holder det kolde vand væk. Vandstæren kan bevæge sig på bunden af vandløbet ved at svømme mod strømmen. Presset fra det strømmende vand holder fuglen nede.