



Almindelig blåfugl

Latinsk navn: *Polyommatus icarus*

Engelsk navn: Common Blue

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle

Almindelig blåfugl er udbredt i hele landet og findes på marker, hejder, overdrev, enge, i klitter, skovlysninger og haver. Almindelige blåfugl lever i kolonier.

Kendetegn

Almindelig blåfugl er en lille og spinkel blåfugl. Vingeundersiden er grålig med orange og sort-hvide pletter. Hannen er lys blå på oversiden med smal sort kant og hvide frynser. Hunnen varierer fra mørkebrun til blå med små, orange pletter. Larven er grøn og håret med hvid stribe langs siden.

Føde

Sommerfuglen lever af nektar fra mange forskellige blomster, og larven æder blade og blomster fra kløver og ærteblomstplanter.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 24-33 mm
Flyvetid: Maj-september
Antal kuld: 2
Larvelængde: op til 18 mm
Larvetid: 4 uger
Puppetid: 10-20 dage

Vidste du det?

Blåfuglelarver udskiller et sødt, sukkerholdigt sekret, som myrer tiltrækkes af og æder. Til gengæld beskytter myrerne larven mod rovdyr og andre farer.

