




# Blodplet

Latinsk navn: *Tyria jacobaea*  
Engelsk navn: Cinnabar Moth  
Klasse: Insekter  
Orden: Sommerfugle  
Familie: Uglefamilien  
Gruppe: Natsommerfugle

**Blodplet** er ret almindelig og udbredt i det meste af Danmark. Sommerfuglen lever på tørre marker, brakmarker, enge, heder, overdrev og i åbne skovlysninger. Blodplet flyver sent på natten, men man kan se den om dagen, hvis man skræmmer den op.



## Kendetegn

Blodplet har en sort krop, mørke forvinger med en smal, rød streg langs forkanten af vingen og to røde pletter. Sommerfuglen har røde bagvinger med en smal mørk kant. Larven er sort og gul.

## Føde

Den voksne blodplet suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af blade og blomster fra engbrandbæger og vandbrandbæger.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land  
Vingefang: 32-49 mm  
Flyvetid: Maj-juni  
Overvintrer som puppe

### Vidste du det?

Engbrandbæger er en giftig plante, men giften er ikke farlig for larver af blodplet. Larverne optager nemlig giften, så larverne selv bliver giftige. Larvernes sorte og gule advarselsfarver viser, at larverne er giftige. De voksne sommerfugle er også giftige. De har røde og sorte advarselsfarver.