Blodplet

Latinsk navn: **Tyria jacobaea**
Engelsk navn: **Cinnabar Moth**
Tysk navn: **Blutbär**
Svensk navn: **Karminspinnare**
Norsk navn: **Karminspinner**
Klasse: **Insekter**
Orden: **Sommerfugle**
Familie: **Uglefamilien**
Gruppe: **Natsommerfugle**

Blodplet er ret almindelig og udbredt i det meste af Danmark. Sommerfuglen lever på tørre marker, brakmarker, enge, heder, overdrev og i åbne skovlysninger. Blodplet flyver sent på natten, men man kan se den om dagen, hvis man skræmmer den op.



Kendetegn

Blodplet har en sort krop, mørke forvinger med en smal, rød streg langs forkanten af vingen og to røde pletter. Sommerfuglen har røde bagvinger med en smal mørk kant. Larven er sort og gul.

Føde

Den voksne blodplet suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af blade og blomster fra engbrandbæger og vandbrandbæger.

Fakta
Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 32-49 mm
Flyvetid: Maj-juni
Overvintrer som puppe

Vidste du det?
Engbrandbæger er en giftig plante, men giften er ikke farlig for larver af blodplet. Larverne optager nemlig giften, så larverne selv bliver giftige. Larvernes sorte og gule advarselsfarver viser, at larverne er giftige. De voksne sommerfugle er også giftige. De har røde og sorte advarselsfarver.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2026 Jørgen Steen, StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne