



Dansemyg larve og puppe

Latinsk navn: **Chironomus plumosus**

Engelsk navn: **Buzzer Midge**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Tovinger**

Familie: **Dansemyg**


Der findes over 400 forskellige arter af **dansemyg** i Danmark. Fælles for dem er, at de ikke stikker. Dansemyggene lever både inde i landet, ved vådområder og nær kysten. Larverne lever på bunden af vandhuller, søer, brakvand og vandløb.

Kendetegn

Dansemyg har en lang krop og to forholdsvis korte vinger. Benene er fine og lange. Hannen har fjerlignende antenner, mens hunnen har tynde antenner. Dansemyg kan være grå, gule, sorte eller grønne. Larverne er ormelignende og kan være både røde, glasklare og grønne.

Føde

Voksne dansemyg tager ikke føde til sig. De lever kun ganske få dage. Larverne æder alger, plantedele, bakterier, krebsdyr samt andre myggelarver.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 3-10 mm
Vingefang: 15 mm
Parring: Forår-forsommer
Puppetid: Ca. 4-8 uger
Længde: 30 mm

Vidste du det?

Om foråret og om forsommeren kan man se store sværme af dansemyg, hvor parringen finder sted. Æggene klækkes hurtigt, og larverne søger ned på bunden af søen eller vandløbet. Larverne forpupper sig næste forår, og de er efter en månedstid klar til at bryde ud af pupperne og slutte sig til de store sværme.