Frynsevinge

Latinsk navn: **Thysanoptera**
Engelsk navn: **Thrips**
Klasse: **Insekter**
Orden: **Frynsevinger**



Der findes ca. 100 arter af **frynsevinger** i Danmark. Frynsevinger kaldes også for trips, gnavpander eller tordenfluer. Kan ses april-september. Frynsevinger er meget almindelige overalt i det åbne land på enge, marker og i haver. Nogle arter kan optræde i meget store sværme på varme, lumre sommerdage til stor gene, da de kravler på huden og hovedbunden og kravler ind i ører, øjne og næsebor.

Kendetegn

Frynsevinger er små, aflange insekter. Kroppen er mørk med to par frynsede, fjeragtige vinger.

Føde

Frynsevinger suger saft af planter med deres korte, kraftige sugesnabel. Frynsevinger kan gøre stor skade på landbrugsafgrøder.

Fakta
Levesteder: Det åbne land
Længde: 1-2 mm
Nogle arter af frynsevinger kan formere sig ukønnet ved jomfrufødsel
Lægger æg på planter
Nymfe: 4-5 stadier

Vidste du det?
Nymfen er lille, bleg og tyndhudet uden vinger. Efter de første stadier tager nymfen ikke længere føde til sig og bliver meget inaktiv. Sådan gennemgår nymfen de sidste stadier, inden forvandlingen til en voksen frynsevinge er fuldført.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne

Tegn en frynsevinge



Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne

Frynsevingens føde

Fortæl om frynsevinge

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne