



Grønåret kålsommerfugl

Latinsk navn: **Pieris napi**
Engelsk navn: **Green-veined white**
Tysk navn: **Rapsweissling**
Svensk navn: **Rapsfjäril**
Norsk navn: **Rapssommerfugl**
Klasse: **Insekter**
Orden: **Sommerfugle**
Familie: **Hvidvinger**

Grønåret kålsommerfugl er en af Danmarks mest almindelige dagsommerfugle. Den trives godt i mange forskellige miljøer, fx i det åbne land, i haver, skove og parker og i dyrkede marker med raps.



Kendetegn

Grønåret kålsommerfugl ligner andre kålsommerfugle, bortset fra artens tydelige grønne årer på vingeundersiderne. Individerne er meget forskellige og kan have et varierende antal mørke pletter.

Føde

De voksne individer stiller ikke særlige krav til bestemte foderplanter, som de suger nektar fra. Man skulle tro, at larverne levede af kålplanter, men de foretrækker i stedet ofte vilde karse- og sennepsplanter samt raps.

Fakta

Vingefang 37-48 mm
Flyvetid: Maj-oktober
Æggene lægges på planter af korsblomstfamilien
Klækketid: En uge
Larvetid: To uger
Puppetid: En uge

Vidste du det?

Grønåret kålsommerfugl har ofte to generationer om året. I første generation er vingeoversiderne helt hvide. Hunnerne har et par ekstra pletter på forvingerne og én på bagvingerne.

I 2. generation har hannerne en sort plet på forvingerne