Harlekin

Latinsk navn: **Calospilos sylvata**
Engelsk navn: **Magpie**
Tysk navn: **Ulmen-harlekin**
Svensk navn: **Krusbärsmätare**
Norsk navn: **Stikkelsbærpraktmåler**
Klasse: **Insekter**
Orden: **Sommerfugle**
Familie: **Målere**
Gruppe: **Natsommerfugle**

Harlekin er en almindelig og let genkendelig natsommerfugl. Den er udbredt i hele Danmark. Man ser af og til harlekin-sommerfuglen om dagen, hvis den forstyrres og jages op fra en busk, hvor den hviler.

Kendetegn

Harlekin-sommerfuglen er let genkendelig på forvingernes hvide farve med mange sorte pletter og et brunligt, orange eller gult bånd. Bagvingerne er helt hvide med sorte pletter. Han og hun er ens.

Føde

De voksne sommerfugle lever af nektar. Larven lever af blade fra småbuske, især stikkelsbærbuske. Derfor kaldes larven også for "stikkelsbærmåler". Larverne er meget grådige og kan anrette stor skade i gartnerier og haver.

Fakta
Levesteder: Skoven, Det åbne land
Vingefang: 35-45 mm
Parring: Juli-august
Larvetid: Overvintrer
Puppetid: Ca. 6 uger

Vidste du det?
Harlekin-sommerfuglenes larver betragtes som skadedyr, fordi de ofte vælger bærbuske, fx stikkelbær, solbær og ribs som deres foretrukne føde. Larverne bekæmpes af og til med insektgift, hvis et gartneri eller en frugtplantage er udsat for et stort angreb.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2026 Jørgen Steen, StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne