



# Ligustersværmer

Latinsk navn: *Sphinx ligustri*


Engelsk navn: Privet Hawk-moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Aftensværmere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



**L**igustersværmeren er en af vore største sommerfugle. Den voksne sommerfugl ses fra maj til midt i juli.

## Kendetegn

Forreste del af kroppen er sort, og bagkroppen er rød med seks sorte tværstriber. Farverne fra kroppen gentages lidt svagere på vingerne. Forvingerne er store og tilspidsede, mens bagvingerne er meget små.

## Føde

Ligustersværmeren har fået sit navn, fordi larven ofte lever på buske som liguster og syrener. Larven er meget almindelig i hække og hegn. Den voksne ligustersværmer lever af nektar, som den bl.a. finder i kaprifolier.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land  
Vingefang: 10-12 cm  
Parring: Juni-juli  
Æg: 150-200  
Larvetid: Ca. 3 måneder  
Puppetid: Overvintrer

### Vidste du det?

Ligustersværmeren flyver mest om natten, hvor den holder af at suge nektar fra kaprifolier. Om dagen hviler den sig – ofte på en stamme tæt ved jorden. Den kan være vanskelig at få øje på, fordi den ligner en udvækst på træets bark.



## Tegn en ligustersværm

