



Sekspletttet køllesværmer

Latinsk navn: *Zygaena filipendulae*

Engelsk navn: Six-Spot Burnet

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Køllesværmere

Gruppe: Småsommerfugle

Sekspletttet køllesværmer er almindelig og udbredt i det meste af Danmark. Den lever i tørre og blomsterrige enge, overdrev, skrænter, sandede marker, heder og klitter. Sekspletttet køllesværmer er kun fremme i solskin.

Kendetegn

Sekspletttet køllesværmer har skinnende, blåsorte eller metalgrønne vinger med seks røde pletter på hver forvinge. Bagvingerne er røde med sorte kanter. Sommerfuglen har store, kølleformede antenner. Larven er flad og gul med sorte pletter.

Føde

Sommerfuglen suger nektar fra forskellige blomster som knopurt, tidsler og blåhat. Larven lever af blade fra rød-kløver, kællingetand, musevikke og andre ærteblomstrende planter.



Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 28-40 mm
Flyvetid: Juni-august
Larvelængde: 22 mm
Overvintrer som larve

Vidste du det?

Sekspletttet køllesværmers sorte og røde farver fungerer som advarselsfarver til fugle og andre rovdyr. Hvis sommerfuglen alligevel angribes, udskiller den en gul væske, der smager grimt.