



Skovmyg

Latinsk navn: *Aedes communis*

Engelsk navn: Mosquito

Klasse: Insekter


Orden: Tovinger

Familie: Stikmyg

Kendetegn

Skovmyggene kendes især på deres summelyd. Hunnen har en lang stiksnabel. Hannen har fjerformede antenner. Skovmyggens larver findes om foråret i de fleste småsøer og vandhuller, hvor de "hænger" med deres ånderør stukket op gennem vandoverfladen.


Skovmyggen er meget almindelig i skove og krat, hvor de yngler i små vandhuller, vandpytter og grøfter.



Føde

Skovmyggene lever af nektar fra blomsterplanter. Men hunnen har brug for blod fra pattedyr eller mennesker, hvis æggene skal udvikles bedst muligt. Derfor er det kun hunnen, der stikker og suger blod. Den kan til gengæld stikke og suge et blodmåltid til sig op til 20 gange i sin levetid.

Larve



Puppe



Fakta

Levesteder: Skoven,

Sø og vandløb

Størrelse: Ca. 7 mm

Parring: Maj-august

Æg: Overvintrer i ud-

tørrede vandpytter

Larvetid: 5-8 uger

Puppetid: 3-4 dage

Vidste du det?

Når hunnmyggen stikker, sprøjter den en væske ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Det er denne væske, som giver kløende myggestik. Hvis man lader myggen suge blod i fred, vil den suge det meste af væsken op sammen med blodet.