



# Skovmyg


Latinsk navn: *Aedes communis*

Engelsk navn: Mosquito

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Stikmyg



**S**kovmyggen er meget almindelige i skove og krat, hvor de yngler i små vandhuller, vandpytter og grøfter.

## Kendetegn

Skovmyggene kendes især på deres summelyd. Hunnen har en lang stiksnabel. Hannen har fjerformede antenner. Skovmyggens larver findes om foråret i de fleste småsøer og vandhuller, hvor de "hænger" med deres ånderør stukket op gennem vandoverfladen.

### Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb  
Størrelse: Ca. 7 mm  
Parring: Maj-august  
Æg: Overvintrer i udtørrede vandpytter  
Larvetid: 5-8 uger  
Puppetid: 3-4 dage

### Føde



Skovmyggene lever af nektar fra blomsterplanter. Men hunnen har brug for blod fra pattedyr eller mennesker, hvis æggene skal udvikles bedst muligt. Derfor er det kun hunnen, der stikker og suger blod. Den kan til gengæld stikke og suge et blodmåltid til sig op til 20 gange i sin levetid.

### Vidste du det?

Når hunmyggen stikker, sprøjter den en væske ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Det er denne væske, som giver kløende myggestik. Hvis man lader myggen suge blod i fred, vil den suge det meste af væsken op sammen med blodet.




## Tegn en skovmyg





## Skovmyggens føde



## Fortæl om skovmyg

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---