



Skovrandøje

Latinsk navn: *Pararge argeria*


Engelsk navn: Speckled Wood

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Skovrandøje er tilpasset livet i skoven. Den holder især til i små lysninger eller i skovbryn, hvor der falder lidt sol gennem træerne. Skovrandøjerne ses fra maj til oktober.

Kendetegn

Skovrandøje kendes fra andre randøjer på sin brune farve. De gule pletter på vingerne er større hos hunnen end hos hannen. Larven er grøn.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 3,5-4,5 cm
Parring: Maj-september
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2-4 uger
Kan overvintre både som larve og som puppe.

Føde



Skovrandøje holder til i løvskove. Larven lever af forskellige græsser i skovbunden. Den voksne sommerfugl lever især af saft fra træer og fra frugter.

Vidste du det?

Hannen hos skovrandøje vælger et territorium i en lysning i skoven, som den forsvare. Hvis der kommer fremmede sommerfugle indenfor hannens territorium, bliver de jaget bort.





Tegn en skovrandøje





Skovrandøjes føde



Fortæl om skovrandøje
