



Stor kålsommerfugl

Latinsk navn: *Pieris brassicae*

Engelsk navn: Large White

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Hvidvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Stor kålsommerfugl er meget almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Sommerfuglen lever i det åbne land på enge, overdrev, dyrkede marker, i klitter og i haver. Stor kålsommerfugl kan vandre i store sværme, og der kommer ofte mange træksommerfugle hertil om sommeren.

Kendetegn

Stor kålsommerfugl er en stor, kraftig sommerfugl med mørk krop, hvide vinger og gullig underside. Den har en stor, sort plet på randen af forvingen. Hunnen har desuden to sorte pletter midt på forvingen. Larven er gulgrøn med sorte pletter og lyse striber.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
 Vingefang: 50-65 mm
 Flyvetid: April-oktober
 2-4 generationer om året
 Larvelængde: 37-43 mm
 Larvetid: 4-5 uger
 Puppetid: 2 uger (den sidste generation overvintrer som puppe)

Føde



De voksne sommerfugle suger nektar i blomster, især tidsler. Larven æder blade af raps, senep, kål og vilde korsblomstrede planter.

Vidste du det?

Larver af stor kålsommerfugl kaldes kålorme, og de kan gøre stor skade i køkkenhaver og på marker med kål. Kålormene bekæmpes med insektgift i landbruget.



Tegn en stor kålsommerfugl





Stor kålsommerfugls føde



Fortæl om stor kålsommerfugl
