



Storplettet perlemorsommerfugl

Latinsk navn: *Issoria lathonia*


Engelsk navn: Queen of Spain Fritillary

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Storplettet perlemorsommerfugl er almindelig i det meste af landet. I nogle år kan arten dog være ret sjælden. Sommerfuglen kræver varme og lever i klitter, på tørre, sandede overdrev og brakmarker. Perlemorsommerfuglen optræder også i haver på sommerfuglebusken.

Kendetegn

Sommerfuglen er gylden med store, sorte pletter på oversiden og orange med sorte pletter og meget tydelige, sølvskinnede perlemorspletter på undersiden. Bagvingen er firkantet. Storplettet perlemorsommerfugl er en livlig og lidt urolig sommerfugl. Den sidder dog ofte og solbader med udbredte vinger.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
 Vingefang: 35-48 mm
 Flyvetid: April-oktober
 3-4 generationer
 Larvelængde: Omkring 30 mm
 Larvetid: 2-4 uger (den sidste generation overvintrer som larve)
 Puppetid: 1-2 uger

Føde



Sommerfuglen suger nektar i mange forskellige blomster.

Vidste du det?

Larver af storplettet perlemorsommerfugl er gråsorte med hvide pletter. Larverne lever især på stedmoderblomster.




Tegn en storplettet perlemorsommerfugl





Storplettet perlemorsommerfugls føde



Fortæl om storplettet perlemorsommerfugl
