



Svalehale

Latinsk navn: *Papilio machaon*
Engelsk navn: Swallowtail
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Svalehalefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle



Svalehalen er meget sjælden i Danmark. Den har ikke ynglet fast siden 1978 og optræder nu kun på træk eller strejf fra andre lande. Svalehalens naturlige udbredelsesområde er øst for Danmark. Svalehaler kan ses på skrænter, fugtige enge og store moser med skærmplanter.

Føde

Larverne lever på skærmplanter som kærsvovlrod, vild gulerod og angelik. De voksne svalehaler suger nektar i blomster.

Kendetegn

Svalehaler er gule med sorte tegninger på oversiden. På hver bagvinge har de en rød øjenplet og metalskinnede blåsorte pletter. Svalehaler har lange haler på bagvingerne. Som voksne er larverne lysegrønne med orangeøde pletter og sorte striber. Både larverne og de voksne svalehaler har advarselsfarver.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 64-85 mm
Flyvetid: Maj-august
1-2 generationer
Larvelængde: 50 mm
Overvintrer ofte som puppe

Vidste du det?

Svalehaler er dygtige flyvere, og i bjergområder ses hanner og hunner ofte flyve rundt om himlen højt oppe i luften eller ved toppen af høje bakker eller bjerge. Dette kaldes "hilltopping" og er en form for parringsflugt.