



Markfirben

Latinsk navn: *Lacerta agilis*
Engelsk navn: Sandlizard
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Skælklædte krybdyr
Familie: Firben



Markfirbenet lever spredt i det meste af landet, i grupper eller i kolonier. Firbenene foretrækker varme og tørre steder som klitter, heder, grusgrave, sydvendte skråninger eller bakker, hvor æggene kan graves ned og udruges af solvarmen. Ungerne kan være aktive helt til november.

Kendetegn

Firbenet er kraftigt med et ret højt hoved. I yngletiden kan hannen kendes på sine flotte, græsgrønne sider med sort marmorering. Hunnen er brunlig med mørke firkanter med hvide "øjepletter" i midten. Markfirbenet har to lysegrå bånd langs ryggen.

Føde

Føden består af smådyr og insekter som bl.a. græshopper, sommerfuglelarver og biller.

Fakta



Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Længde: 14-23 cm
Hunnen er størst
Parring: Maj
Æglægning: Juni-juli
Antal æg: 5-17, klækkes i
august-september
Antal kuld: 1-2
Dvale: September-april/maj

Vidste du det?

Ligesom det almindelige firben kan markfirben smide deres hale, hvis de angribes. Markfirbenet skifter hud 1-4 gange om året ligesom andre krybdyr.




Tegn et markfirben





Markfirbenets føde



Fortæl om markfirbenet
