



Skimmelflagermus

Latinsk navn: xx
Engelsk navn: xx
Klasse: xx
Orden: xx
Familie: xx



Skimmelflagermusen er almindelig udbredt i Nordøstsjælland, i Østjylland og på Bornholm. Arten jager, når det er mørkt, ved at udsende lydølger, der kastes tilbage til flagermusen som et ekko. Flagermusen jager over åbne områder som marker og inde i byer ved gadelys, der tiltrækker insekter. Om vinteren holder flagermusene til i bygninger og på lofter.

Kendetegn

Skimmelflagermus kan genkendes på de sort-brune hår på ryggen med sølvhvide eller grålige spidser. På undersiden er pelsen flødefarvet til gråhvid. Skimmelflagermusen frembringer høje kliklyde i parringstiden.

Fakta

Biotoper: Det åbne land
Længde: 5,5-6,3 cm
Vingefang: 28-30 cm
Vægt: 8-18 g
Kuld størrelse: 2 unger
Antal kuld: 1

Føde

Skimmelflagermus æder myg, bladlus, natsommerfugle, biller og andre insekter.

Vidste du det?

Skimmelflagermus parrer sig om efteråret, men selve befrugtningen sker ikke ved parringen. Først til foråret, hvor omkring 30-50 hunner danner en ynglekoloni sådan, bliver hunnens æg befrugtet af sæden, der har ligget i hunnens livmoder siden parringen. Når det bliver sommer, føder hunnen de små flagermusunger.