



Tangborre

Latinsk navn: *Psammechinus miliaris*

Engelsk navn: Sea urchin

Klasse: Smådyr

Orden: Echinoida

Familie: Parechinidae

Tangborre er et almindeligt søpindsvin i de danske farvande. Søpindsvinet findes fra Nordsøen til vestlige Østersø og lever især på lavt vand i områder med alger og bændeltang.

Kendetegn

Tangborren er et regulært søpindsvin. Regulære søpindsvin er symmetriske med kraftige pigge, en mundåbning og et veludviklet tandapparat på undersiden samt gat og kønsåbninger i toppen. Tangborre er grøn-brunlig med korte, grønne pigge og violette pigspidser. Dyret kan dække sig med algestumper, som holdes fat med sugefødderne.



Føde

Tangborrerne er næsten altædende og lever bl.a. af bændeltang, alger, muslinger, rurer, mosdyr, sækdyr og snegle.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 4 cm

Æg og sæd gydes frit i vandet i forsommeren

Larverne er pelagiske 1-3 uger

Larvetid: Omkring 5-6 uger

Kønsmoden efter ca. 1 år

Maks. levetid: 5-6 år

Vidste du det?

Tangborren findes tit opskyllet på stranden. Ofte er det kun tangborrens tomme, nøgne skaller, man kan finde. Af og til kan man dog være heldig at finde hele dyret med pigge og kroppen inde i skallen.