



Almindelig østershat

Latinsk navn: **Pleurotus ostreatus**

Engelsk navn: **Oyster mushroom**

Tysk navn: **Oustern-Seitling**

Svensk navn: **Ostronmussling**

Norsk navn: **Blågrå østersopp**

Gruppe: **Svampe**

Orden: **Champignokordenen**

Familie: **Østershatte**

Almindelig østershat er en vednedbrydende svamp, der især lever på dødt løvtræ, især bøg, men også birk, lind, pil og poppel. Svampen om-danner ved nedbrydningen træet til næringsstof-fer, som både planter og bakterier kan udnytte.

Almindelig østershat dan-ner sine frugtlegerer i tætte, taglagte bundter med mange hatte på samme stamme, som kan være næsten dækket af østershatte. Den kan vokse året rundt, og ses især i vin-terhalvåret

Kendetegn

Hatten er musling- eller vifteformet og kan blive om-kring 5–15 cm i diameter. Farven er ofte stålgrå og blå-lig om vinteren - mere brun-lige eller gråbrune nuancer om sommeren.

På undersiden har den tætte, lameller, der fortsætter et stykke ned ad den korte stok. Kødet er hvidt og blødt i unge frugtlegerer, men sejt og læ-deragtigt på ældre svampe.



Fakta

Frugtlegerer: 5-15 cm i diameter
Lameller hvide til gråblå

Vidste du det?

Almindelig østershat er en fremragende spis-svamp med mild, lidt frugtig duft og fast konsistens. Svampen findes i naturen eller dyrkes. Den kan leve på mange former for plantemateriale, fx træflis og halm.