




Almindelig stinksvamp

Latinsk navn: **Phallus impudicus**
Engelsk navn: **Common stinkhorn**
Tysk navn: **Gemeine Stinkmorchel**
Svensk navn: **Stinksvamp**
Norsk navn: **Stanksopp**
Gruppe: **Svampe**
Orden: **Stinksvampordenen**
Familie: **Stinksvampfamilien**

Almindelig stinksvamp er almindelig i Danmark, især i løv- og nåleskove, hvor den vokser på formløst træmateriale. Svampen kaldes i sin yngste fase "hekseæg" fordi den ligner et æg i skovbunden. Unge hekseæg kan koges og spises. I den senere, aflange form kaldes svampen også "præstepik". Selve svampen vokser op i august. Slimlaget, der dækker svampen, indeholder svampens sporer. Den særprægede lugt fra svampen tiltrækker fluer, som spiser af slimlaget og dermed spreder sporerne. Denne insektbase-rede strategi er afgørende for svampens spredning.

Livscyklus

Svampen begynder som et hvidt, ægformet hekseæg på 4-6 cm i diameter, ofte delvist begravet i jorden. Ægget rummer en geléagtig masse med en fast, hvid kerne, der senere bliver til stammen. I løbet af 12-24 timer revner ægget, og stilken skyder op med en vækstrate på op til 5 cm i timen, indtil den når en højde på 25-30 cm.



Fakta

Hat: 4-6 cm i diameter
Højde: 25-30 cm

Vidste du det?

Man har observeret, at almindelig stinksvamp kan vokse med 10-15 cm pr. time, hvilket gør den til en af de hurtigstvoksende svampe i verden.