



Brunstokket rørhat

Latinsk navn: **Imleria badia**

Engelsk navn: **Bay bolete**

Tysk navn: **Maronen-Röhrling**

Svensk navn: **Brunsopp**

Norsk navn: **Svartbrun rørsopp**

Gruppe: **Svampe**

Orden: **Rørhatnordenen**

Familie: **Rørhatfamilien**



Brunstokket rørhat er almindelig i Danmark. Svampen findes normalt i sure, mørke nåleskove under gran eller fyr, sjældnere i løvskove. Den vokser enkeltvis eller i grupper. Sæsonen løber fra juli til november. Svampen er en af Danmarks mest kendte spisesvampe og nem at genkende.

Kendetegn

Hatten er 5-15 cm i diameter, kastanjebrun til mørkebrun. Unge svampe er halvkugleformede men senere mere flade og ofte slimede i fugtigt vejr. Rørene på hattens underside er gule til grønligt olivenfarvet - de bliver blå ved tryk. Stokken er lys brun, sribet og uden netmønstre. Kødet er fast og gulligt, men bliver blåligt ved skæring.

Fakta

Hat: 5-15 cm i diameter

Stok: Ca. 10 cm høj

Vidste du det?

Brunstokket rørhat er en fremragende spisesvamp, når den koges eller steges. Den bruges i gryderetter og kan tørres til senere brug. Tørring fjerner ofte orme.