



Rødknæ

Latinsk navn: *Rumex acetosella*

Engelsk navn: Sorrel

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet

Orden: Pileurtordenen

Familie: Syrefamilien

Rødknæ er vidt udbredt og meget almindelig urt i Danmark, hvor den vokser på heder, marker, tørre enge, langs veje, på sandkyster og i klitter. Planten breder sig ved rodskud og med frø.

Stængel og blade

Urtens stængel er opret med tynde forgreninger fra midten og opefter. Bladene er lancetformede med to opadbøjede flige eller "modhager". Bladene kaldes derfor også spydformede.

Blomster og frugter

Hos rødknæ bærer hver enkelt plante enten han- eller hunblomster. Hanblomsterne har seks støvblade, hvorimod hunblomsterne har tre støvfang. Blomsterne sidder desuden i små, adskilte kranse på lange, gredede stilke. Urtens frugt er en 1-1,5 mm stor, brun og skinnende nød med 1 frø.



Hanblomst

Fakta

Voksesteder: Det åbne land, Kyst

Flerårig

Højde: 15-40 cm

Rod: Jordstængel

Blade: Spyd- eller lancetformede

Blomstrer: Juni-juli

Frugt: Nød

Vidste du det?

Rødknæ har fået sit danske navn, fordi planten har røde skedehinder ved hvert "knæ" eller bladfæste.