



Vorterod

Latinsk navn: *Ranunculus ficaria*

Engelsk navn: Lesser Celandine

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet

Orden: Ranunkelordenen

Familie: Ranunkelfamilien

Vorterod vokser vildt på god muldjord i løvskove og krat, men den findes også i haver og parker. Planten har tidligt om foråret gule, stjerneformede blomster. De åbner sig kun i solskin. Efter blomstringen visner bladene bort. Vorterod har små kartoffelformede knolde og hvide rødder.

Blade, blomster og frugter

Bladene er 3-5 cm brede og hjerte- eller nyreformede. De sidder tæt sammen. Vorterod formerer sig især ved yngleknopper fra bladhjørnerne. Når planterne visner sidst på foråret, ligger yngleknopperne tilbage. De spirer i løbet af vinteren. Blomsten har tre grønne bægerblade og 8-10 ægformede, skinnende kronblade. Planten bestøves af bier, men den danner sjældent frugter.



Fakta

Voksesteder: Løvskov, mose, eng,

Det åbne land, Kyst og hav

5-25 cm høj

Flerårig

Ammerødder og trævlerødder

Blomstrer i april-maj

Frugt: Nød

Vidste du det?

Nogle planter formerer sig ved frø, andre ved udløbere. Vorterod danner yngleknopper, der er en nøjagtig kopi af den plante, som knoppen dannes af. Planten spredes ofte med lidt jord, som klæber til dyr eller fodtøj.