



Admiral

Latinsk navn: *Vanessa atalanta*


Engelsk navn: Red Admiral

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Admiralen er en af vore flotteste og lettest genkendelige dagsommerfugle. Admiralen er en træk-sommerfugl, som kommer flyvende sydfra for at lægge æg – som regel på brændenælder. Æggene klækkes efter en uges tid, og larverne lever på nældeblade i 3-4 uger, hvorefter de spinder en lille rede øverst i en nælde og forpupper sig deri.

Kendetegn

Admiralen kendes især på sine tydelige røde bånd tværs over forvingerne og bagest på bagvingerne. Den flyver af sted med meget hurtige vingeslag uden at svæve.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 5-6 cm
Parring: Maj-september
Æg: Op til 1.000
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2 uger

Føde

Admiralens larve lever af nældeblade. Den voksne admiral lever af nektar. Den ses ofte på sommerfuglebuske.

Vidste du det?

Admiralen overvintrer ikke i Danmark, men den trækker om efteråret sydpå - af og til helt til Norditalien, hvor den lægger sine æg. Om foråret og om sommeren kommer nye generationer af admiraler til Danmark.



Aurora

Latinsk navn: *Anthocharis cardamines*


Engelsk navn: Orange Tip

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Hvidvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Aurora er almindelig og udbredt i det meste af Danmark, dog ikke på den jyske vestkyst. Sommerfuglen lever i fugtige og blomsterrige områder med åbne skove, marker, skovbryn, overdrev, levende hegn og enge. Aurora kan også ses i haver.

Kendetegn

Hannen er hvid med orange forvingespids, og hunnen er hvid med gråsorte forvingespids. Begge køn har to sorte pletter på forvingen. Underside af vingerne er hvide med mosgrønt, mosaikagtigt mønster. Larven er slank og blågrøn med små pletter.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 37-47 mm
Flyvetid: April-juni
Larvelængde: 29-35
Larvetid: 2-3 uger
Overvintrer som puppe

Føde

Aurora suger nektar i vilde blomster, især korsblomster som engkarse.

Vidste du det?

Larven lever af frøskulper fra korsblomstrede planter som engkarse. Hunnen lægger æggene enkeltvis på foderplanterne, og æggene klækkes efter 5-6 dage.

Busksommerfugl

Latinsk navn: *Callophrys rubi*


Engelsk navn: Green Hairstreak

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Grøn busksommerfugl er ret almindelig i Jylland. Mere sjælden på Øerne. Sommerfuglen lever på marker, heder, overdrev, åbne krat og i klitter, moser, skovbryn og skovlysninger.

Kendetegn

Grøn busksommerfugl er gråbrun på oversiden, og græsgrøn på undersiden af vingerne med et varierende antal hvide pletter på bagvingen. Den sidder som regel med lukkede vinger, så man ser vingernes grønne underside.

Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 22-27 mm

Flyvetid: April-juli

Larvelængde:

Larvetid: 2-4 uger

Overvintrer som puppe

Føde

Sommerfuglen lever af nektar fra mange forskellige blomster.

Vidste du det?

Larverne er grønne og tykke. De æder blade, blomster og frugter fra mosebølle, gyvel og andre buske og urter.

Citronsommerfugl

Latinsk navn: *Gonepteryx rhamni*

Engelsk navn: **Brimstone**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Hvidvingefamilien**

Gruppe: **Dagsommerfugle** ☀



Citronsommerfuglene ses ofte meget tidligt om foråret, fordi de voksne sommerfugle overvintrer i naturen. De kommer frem, når den første forårs-sol får temperaturen i skovene til at stige. Citronsommerfuglene er ret udbredte i Danmark, fordi de strejfer meget rundt.

Kendetegn

Hannen er let at kende på sin kraftige gule farve, mens hunnen er mere hvidgul og kan minde om en kålsommerfugl. Både han og hun har en orange plet midt på vingerne.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 5,5-6 cm
Parring: April-juni
Larvetid: 4 uger
Puppetid: 2 uger

Føde

Den voksne citronsummerfugl lever især af nektar, men larven lever udelukkende af blade fra tørstetræet. Citronsommerfuglen yngler derfor i områder, hvor tørstetræet vokser.

Vidste du det?

Citronsommerfuglene suger nektar fra mange forskellige slags blomster. Om foråret foretrækker de gule blomster som mælkebøtte. Senere på året foretrækker de i sær violette blomster.



Dagpåfugleøje

Latinsk navn: *Inachis io*


Engelsk navn: Peacock Butterfly

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Dagpåfugleøje er meget almindelig i Danmark.
Den kan ikke forveksles med andre sommerfugle.

Kendetegn

Dagpåfugleøje kendes på de blå og gule øjepletter på de rødbrune vinger. Hvis en dagpåfugleøje bliver truet, fx af en fugl, der vil spise den, folder den sine vinger ud og truer fuglen ved at vise sine store øjepletter. Fuglen tror måske, det er øjnene fra et rovdyr og trækker sig bort i en fart.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 5,5-6,5 cm
Parring: April-maj
Æg: Op til 500 pr. hob
Larvetid: 3-5 uger
Puppetid: 2-4 uger

Føde

Den voksne dagpåfugleøje lever især af nektar, men den suger også saft fra træer og fra frugt. Larven lever udelukkende af blade fra brændenælder.

Vidste du det?

Dagpåfugleøje kan lave høje lyde for at skræmme rovdyr bort. Når den gnider forvingerne mod bagvingerne opstår en skrattende lyd ligesom når tørre blade rasler. Når dagpåfugleøje derefter åbner sine vinger og viser øjnene, vil det skræmme mange rovdyr bort.



Dukatsommerfugl

Latinsk navn: *Lycaena virgaureae*


Engelsk navn: Scarce Copper

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Dukatsommerfuglen er almindelig i store dele af Danmark. Den er dog ret sjælden i Nordjylland, Sønderjylland, på Fyn og en del mindre øer. Sommerfuglen lever på heder, bakkeskråninger, blomsterrige marker og enge, overdrev og i skovlysninger.

Kendetegn

Hannen har gyldne, orangerøde vinger med sort kant og søm. Hunnen har orange forvinger med mørke pletter, sort kant og søm. Begge køn er lysebrune med sorte og hvide pletter på undersiden. Larven er grøn.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 28-34 mm

Flyvetid: Juni-september

Overvintrer som æg

Larvetid: Omkring 2 måneder

Puppetid: 2-3 uger

Føde

Dukatsommerfugl lever af nektar fra mange forskellige blomster. Larven lever af planter fra syrefamilien, især rødknæ og almindelig syre.

Vidste du det?

Hos dukatsommerfugle klækker hannerne før hunnerne, så hannerne er klar til at tage imod hunnerne og parre sig med det samme.

Græsrandøje

Latinsk navn: *Maniola jurtina*


Engelsk navn: Meadow Brown

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Græsrandøje er en meget almindelig og talrig sommerfugl i Danmark. Sommerfuglen lever i det åbne land på marker, enge, heder, overdrev og i skovlysninger eller haver med højt græs.

Kendetegn

Græsrandøje er en brun sommerfugl. Hannen er helt mørkebrun med sort-hvid øjeplet på forvingen. Hunnen er brun med sort-hvid øjeplet omgivet af et orange felt på forvingen. Græsrandøje kan have små øjepletter på bagvinger. Dagsommerfuglen flyver hoppende lavt over græsset.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 36-52 mm
Larvelængde: op til 30 mm
Flyvetid: Maj-september
Puppetid: 2-4 uger

Føde

Græsrandøje suger nektar i blomster. Larven æder græs.

Vidste du det?

Larverne er lysegrønne med lange hår, en smal hvidgul stribe på hver side og to horn i bagenden. Larven er aktiv om natten.



Hedepletvinge

Latinsk navn: *Euphydryas aurinia*


Engelsk navn: Marsh fritillary

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Hedepletvinge er en sjælden sommerfugl i Danmark. Den findes kun få steder i Nordjylland. Hedepletvinge lever i små kolonier i det åbne land på blomsterrige og fugtige heder, enge, overdrev, i klitter og ved moser. Hedepletvingen er fredet.

Kendetegn

Hedepletvinger er brogede med sorte, hvide, røde og orange tegninger på oversiden af vingerne. På undersiden har sommerfuglen orange og hvide tegninger og en takket stribe på bagvingen med mørke pletter i midten. Hannen har en smal bagkrop og spidse vinger. Hunnen har en bred bagkrop.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 30-42 mm
Flyvetid: Juni
Æg: 200-400
Overvintrer som larve

Føde

De voksne sommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larverne lever især på planten djævelsbid.

Vidste du det?

Når hannen finder en hun, udsender han duftstoffer ved at vifte med vingerne, hvorefter parringen finder sted. Hunnen kravler derefter rundt mellem planter og lægger æggene på foderplanten djævelsbid. Larverne lever sammen på djævelsbid i et spind.



Rødplettet blåfugl

Latinsk navn: *Aricia agestis*


Engelsk navn: Brown Argus

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Rødplettet blåfugl er almindelig og lokalt meget talrig. Arten er dog ret sjælden i Vest- og Sønderjylland. Rødplettet blåfugl lever i tørre og blomsterrige marker, enge, overdrev og heder.

Kendetegn

Rødplettet blåfugl er en brunlig, lille sommerfugl. På oversiden er vingerne chokoladebrune med orangerøde pletter ved sømmen, og på undersiden er vingerne lyse med sorte og orange pletter. Larven er grøn med rød ryglinie og røde sidelinier.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 24-28 mm
Flyvetid: Maj-september
2 generationer
Larvelængde: 10 mm
Puppetid: 2 uger

Føde

De voksne sommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af planter fra storkenæbfamilien.

Vidste du det?

Den første generation af rødplettet blåfugl kommer på vingerne i maj og kan ses frem til juni. I denne periode lægger de æg, som bliver til larver. Efter en måned forpupper larverne sig, og i juli kommer den anden generation af sommerfugle på vingerne. Larverne overvintrer og forpupper sig til foråret.

Lille ildfugl

Latinsk navn: *Lycaena phlaeas*


Engelsk navn: Small Copper

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Lille ildfugl er meget almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Dagsommerfuglen lever på overdrev, brakmarker, heder og i haver og klitter med mange blomster

Kendetegn

Lille ildfugl har gyldne, orangerøde forvinger med små, sorte pletter og grålig kant. Bagvingerne er sortbrune eller grålige med orangegyldne bånd og små pletter. Undersiden af bagvingerne er lysegrå med sorte pletter. Larven er grøn og korthåret med rødbrun stribe.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 25-30 mm
Flyvetid: April-oktober
Kuld: 2-3
Larvelængde: 15 mm
Larvetid: 3-5 uger
Puppetid: 2-4 uger

Føde

De voksne ildfugle suger nektar fra forskellige blomster. Larven æder blade fra syre, skræppe, rødknæ og pileurt.

Vidste du det?

Hos lille ildfugl klækker pupperne med hanner først, så hannerne er klar til at parre sig straks, når hunnerne er udvoksede og har forladt puppen. Efter parringen lægger hunnen æg enkeltvis på syre, rødknæ, skræppe eller pileurt.



Nældens takvinge

Latinsk navn: *Aglais urticae*


Engelsk navn: Small Tortoiseshell

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Nældens takvinge er meget almindelig og en af de sommerfugle, vi ser oftest omkring os. Derfor er den blevet udnævnt som Danmarks nationalsommerfugl.

Kendetegn

Nældens takvinge kendes nemt på sin rødbrune vinge farve med de gule og sorte pletter samt de blå pletter langs vingekanterne. Hannen og hunnen er ens. Larverne spinder flere nældeblade sammen og lever i begyndelsen i store flokke.

Føde

Den voksne sommerfugl lever af nektar fra mange forskellige planter. Larven lever udelukkende af brændenældeblade. Nældens takvinge ses meget talrigt i haverne, hvor de bla. flokkes omkring sommerfuglebuske.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 4,5-5 cm
Parring: Maj-juli
Æg: 50-100 i hver hob
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2 uger

Vidste du det?

Nældens takvinge overvintrer som voksen sommerfugl. Derfor finder man tit sommerfuglen i udhuse og skure, hvor de er søgt ind for at få læ for vinterkulden. Allerede i marts begynder de at flyve omkring, når de første blomster er fremme.



Nældesommerfugl

Latinsk navn: *Arashinia levana*


Engelsk navn: Map Butterfly

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Nældesommerfuglen er almindelig udbredt i skovlysninger, hvor der er nælder, som den lægger sine æg på. Æggene hænger ned fra undersiden af et nældeblad, og larverne spinder et spind, som de lever i.

Kendetegn

Nældesommerfuglene træffes i flere varianter i årets løb. Om foråret er de rødbrune med sorte pletter, og om efteråret er de sorte med hvide eller gule bånd. Undersiden er dens særlige kendetegn. Den er broget og inddelt i felter, som har givet sommerfuglen det engelske navn "Map Butterfly".

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 3-4 cm
Parring: Maj-august
Æg: 8-10 i hver kæde
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2 uger

Føde

De voksne nældesommerfugle lever af nektar fra mange forskellige slags blomster. Larverne lever af blade fra brændenælder ligesom larverne fra dagpåfugleøje og nældens takvinge.

Vidste du det?

Nældesommerfuglens æg klæbes sammen i små kæder på 8-10 stk., som hænger ned fra undersiden af brændenælderbladene. Æggene kan være vanskelige at få øje på, fordi de ligner brændenældens blomster.

Okkergul pletvinge

Latinsk navn: *Melitaea cinxia*


Engelsk navn: *Glanville Fritillary*

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvinger

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Okkergul pletvinge er ret sjælden i Danmark, og findes især i Jylland. Den lever på steder med meget sol og varme og kan ses på tørre marker, heder, enge, overdrev og i klitter. Den voksne sommerfugl lever kun nogle få uger.

Kendetegn

Okkergul pletvinge har en okkergul til gulbrun overside med mørke pletter. På undersiden er forvingen orange med enkelte mørke tegninger, og bagvingen er orange, sort og hvid. Dagsommerfuglen hviler sig på planter med lukkede vinger, så man kan se det flotte mønster i orange, sort og hvid på undersiden af bagvingen. Larven er sort med hvide pletter.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 35-45 mm
Flyvetid: Maj-juni
Æg: 50-100
Larvetid: Overvintrer
som larve
Puppetid: 2-3 uger

Føde

Som voksen sommerfugl lever okkergul pletvinge af nektar fra forskellige blomster.

Vidste du det?

De små larver lever især på planten lan-cetvejbred og andre planter fra vejbred-familien. Larverne laver et spind over planten, mens de æder.

Rødplettet blåfugl

Latinsk navn: *Aricia agestis*


Engelsk navn: Brown Argus

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Blåfuglefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Rødplettet blåfugl er almindelig og lokalt meget talrig. Arten er dog ret sjælden i Vest- og Sønderjylland. Rødplettet blåfugl lever i tørre og blomsterrige marker, enge, overdrev og heder.

Kendetegn

Rødplettet blåfugl er en brunlig, lille sommerfugl. På oversiden er vingerne chokoladebrune med orangerøde pletter ved sømmen, og på undersiden er vingerne lyse med sorte og orange pletter. Larven er grøn med rød ryglinie og røde sidelinier.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 24-28 mm
Flyvetid: Maj-september
2 generationer
Larvelængde: 10 mm
Puppetid: 2 uger

Føde

De voksne sommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af planter fra storkenæbfamilien.

Vidste du det?

Den første generation af rødplettet blåfugl kommer på vingerne i maj og kan ses frem til juni. I denne periode lægger de æg, som bliver til larver. Efter en måned forpupper larverne sig, og i juli kommer den anden generation af sommerfugle på vingerne. Larverne overvintrer og forpupper sig til foråret.

Skovrandøje

Latinsk navn: *Pararge argeria*


Engelsk navn: Speckled Wood

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Skovrandøje er tilpasset livet i skoven. Den holder især til i små lysninger eller i skovbryn, hvor der falder lidt sol gennem træerne. Skovrandøjerne ses fra maj til oktober.

Kendetegn

Skovrandøje kendes fra andre randøjer på sin brune farve. De gule pletter på vingerne er større hos hunnen end hos hannen. Larven er grøn.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 3,5-4,5 cm
Parring: Maj-september
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2-4 uger
Kan overvinde både som larve og som puppe.

Føde

Skovrandøje holder til i løvskove. Larven lever af forskellige græsser i skovbunden. Den voksne sommerfugl lever især af saft fra træer og fra frugter.

Vidste du det?

Hannen hos skovrandøje vælger et territorium i en lysning i skoven, som den forsvare. Hvis der kommer fremmede sommerfugle indenfor hannens territorium, bliver de jaget bort.

Stor kålsommerfugl

Latinsk navn: *Pieris brassicae*

Engelsk navn: Large White

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Hvidvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Stor kålsommerfugl er meget almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Sommerfuglen lever i det åbne land på enge, overdrev, dyrkede marker, i klitter og i haver. Stor kålsommerfugl kan vandre i store sværme, og der kommer ofte mange træksommerfugle hertil om sommeren.

Kendetegn

Stor kålsommerfugl er en stor, kraftig sommerfugl med mørk krop, hvide vinger og gullig underside. Den har en stor, sort plet på randen af forvingen. Hunnen har desuden to sorte pletter midt på forvingen. Larven er gulgrøn med sorte pletter og lyse striber.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 50-65 mm
Flyvetid: April-oktober
2-4 generationer om året
Larvelængde: 37-43 mm
Larvetid: 4-5 uger
Puppetid: 2 uger (den sidste generation overvintrer som puppe)

Føde

De voksne sommerfugle suger nektar i blomster, især tidsler. Larven æder blade af raps, senep, kål og vilde korsblomstrede planter.

Vidste du det?

Larver af stor kålsommerfugl kaldes kålorme, og de kan gøre stor skade i køkkenhaver og på marker med kål. Kålormene bekæmpes med insektgift i landbruget.

Storplettet perlemorsommerfugl

Latinsk navn: *Issoria lathonia*


Engelsk navn: Queen of Spain Fritillary

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Storplettet perlemorsommerfugl er almindelig i det meste af landet. I nogle år kan arten dog være ret sjælden. Sommerfuglen kræver varme og lever i klitter, på tørre, sandede overdrev og brakmarker. Perlemorsommerfuglen optræder også i haver på sommerfuglebusken.

Kendetegn

Sommerfuglen er gylden med store, sorte pletter på oversiden og orange med sorte pletter og meget tydelige, sølvskinnede perlemorspletter på undersiden. Bagvingen er firkantet. Storplettet perlemorsommerfugl er en livlig og lidt urolig sommerfugl. Den sidder dog ofte og solbader med udbredte vinger.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 35-48 mm
Flyvetid: April-oktober
3-4 generationer
Larvelængde: Omkring 30 mm
Larvetid: 2-4 uger (den sidste generation overvintrer som larve)
Puppetid: 1-2 uger

Føde

Sommerfuglen suger nektar i mange forskellige blomster.

Vidste du det?

Larver af storplettet perlemorsommerfugl er gråsorte med hvide pletter. Larverne lever især på stedmoderblomster.

Stregbredpande

Latinsk navn: *Thymelicus lineola*

Engelsk navn: Essex Skipper

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Bredpandefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Stregbredpande er meget almindelig og findes i hele Danmark bortset fra på Anholt. Sommerfuglen lever i områder med højt græs uden gødning eller sprøjtegift. Stregbredpander optræder tit mange dyr sammen på marker, enge, overdrev og vejskråninger.

Kendetegn

Stregbredpanden er en lille sommerfugl med okkerfarvede eller gulbrune vinger, en mørk krop og sorte følehornsspidser. Hannen har en tynd, sort streg på forvingerne. Bredpander har en meget lang sugesnabel. Stregbredpander solbader ofte med halvt åbne vinger.

Føde

Bredpander kan med den lange sugesnabel suge nektar i blomster med dybe kronrør som blåhat, oksetunge, knopurt og tidsler. Larven lever af kvikgræs, hundegræs, hvene, fløjsgræs, star og mange andre græsser.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 22-27 mm
Flyvetid: Juni-august
Overvintrer som æg
Larvetid: 4-5 uger
Puppetid: 2-3 uger

Vidste du det?

Hunnen lægger æg i bladskeder på forskellige græsser. Når larven kommer frem til foråret spinder den græsstråets sider sammen, så der dannes et rør. Larven gemmer sig i røret, hvor den er godt beskyttet. Den voksne larve er lysegrøn og lever ikke i et rør.



Svalehale

Latinsk navn: *Papilio machaon*


Engelsk navn: Swallowtail

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Svalehalefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Svalehalen er meget sjælden i Danmark. Den har ikke ynglet siden 1978 og optræder kun på træk eller strejf fra andre lande. Svalehaler kan ses på skrænter, fugtige enge og store moser med skærplanter.

Kendetegn

Svalehaler er gule med sorte tegninger på oversiden. På hver bagvinge har de en rød øjenplet og metalskinnede blåsorte pletter. Svalehaler har lange haler på bagvingerne. Som voksne er larverne lysegrønne med orangeøde pletter og sorte striber. Både larverne og de voksne svalehaler har advarselsfarver.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 64-85 mm
Flyvetid: Maj-august
1-2 generationer
Larvelængde: 50 mm
Overvintrer ofte som puppe

Føde

Larverne lever på skærplanter som kærsvovlrod, vild gulerod og angelik. De voksne svalehaler suger nektar i blomster.

Vidste du det?

Svalehaler er dygtige til at flyve, og i nogle lande kan man se hanner og hunner flyve rundt om hinanden højt oppe i luften på toppen af høje bakker eller bjerge. Dette kaldes "hill-topping" og er en form for parringsflugt.



Tidselsommerfugl

Latinsk navn: *Cynthia cardui*


Engelsk navn: Painted Lady

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Tidselsommerfuglen er verdens mest udbredte dagsommerfugl og kan trække over store afstande. Sommerfuglen kan ses overalt i Danmark og er i nogle år særdeles talrig. I andre år kan den være meget sjælden. Tidselsommerfugle findes i det åbne land på enge, overdrev, grøftkanter og i haver med mange blomster. Tidselsommerfugle kan ikke overvintre i Danmark, da de ikke tåler frost.

Kendetegn

Tidselsommerfugl er en stor sommerfugl med brun krop, orange eller okkerbrun overside med sorte pletter langs bagvingens kant og et sort felt med hvide pletter på forvingespidsen. Undersiden er lysebrun og marmoreret med 5 små øjepletter på hver bagvinge. Larven er sortgrå med torne.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 50-65 mm
Flyvetid: April-november
Larvelængde: 35-40 mm
Larvetid: 3-4 uger
Puppetid: 2 uger

Føde

De voksne tidselsommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larverne lever på tidsler, brændenælder og andre kurvblomster.

Vidste du det?

Tidselsommerfuglen yngler i Nordafrika og vandrer eller trækker nordpå til foråret. Arten ankommer hertil i maj og juni, hvor hunnen lægger æg. De nye voksne tidselsommerfugle er fremme i juli-august og trækker tilbage til Nordafrika i slutningen af sommeren i september-oktober.