

Dansk fugleedderkop


Latinsk navn: *Atypus affinis*

Engelsk navn: Purse-web Spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Fugleedderkopper



Dansk fugleedderkop er sjælden og findes kun få steder i Danmark. Den lever på sandede, sydvendte skråninger med små træer, lyng og spredte buske. Edderkoppen kræver sol og lang kontinuitet. Dansk fugleedderkop kaldes også nordlig fugleedderkop eller tapetseredderkop.

Kendetegn

Dansk fugleedderkop er en stor, kraftig edderkop med store, fremadrettede giftkroge og en tæt, håret bagkrop. Edderkoppen er mørkebrun til brunviolet. Hunnen har korte ben og en stor bagkrop. Hannen er mindre, har længere ben og en mindre bagkrop.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Længde (han): op til 12 mm
Længde (hun): op til 18 mm
Parring: September-oktober
Maks. levealder: omkring 10 år

Føde

Fugleedderkoppen æder bænkebidere, græshopper, fluer, tusindben, biller og andre smådyr og insekter.

Vidste du det?

Dansk fugleedderkop lever nede i jorden i et 30-40 cm langt tyndt, rørformet spind. Røret stikker 4-5 cm op af jorden, og er godt kamufleret. Om efteråret kravler hannen op af røret for at finde en hun, som han kan parre sig med. Hannen bliver ofte ædt af hunnen efter parringen.

Hornmejer


Latinsk navn: *Phalangium opilio*

Engelsk navn: Harvestman

Klasse: Spindlere

Orden: Mejere

Familie: Hornmejere



Hornmejeren er en stor mejer, som er almindelig udbredt i Danmark. Den findes i skove, i haver og på marker. Hornmejeren ses især sidst på sommeren og om efteråret.

Kendetegn

Mejere har en lille oval krop i forhold til deres meget lange ben. Hornmejeren er let at kende fra andre mejere, fordi hannen har to store horn i panden. Hunnen kan være vanskelig at skelne fra andre mejere. Mejere har otte lange ben, som sidder på forkroppen.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Kropslængde (han): 5 mm
Kropslængde (hun): 8 mm
Parring: August-oktober
Æg: Overvintrer
Levetid: 1 år

Føde

Mejere er rovdyr, som især lever af små insekter, snegle, orme og edderkopper. Men de æder også døde dyr, svampe og forskellige frugter.

Vidste du det?

Hornmejerens krop er oval. Ser man godt efter, vil man opdage, at den har både en forkrop og en bagkrop. På forkroppen sidder munden, de store klosakse og otte ben. Hvis hornmejeren angribes, kan den kaste nogle ben. Benene vokser ikke ud igen.

Hvepseedderkop


Latinsk navn: *Argiope bruennichi*

Engelsk navn: Wasp Spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Hjulspindere



Hvepseedderkoppen er almindelig i Danmark. Den lever på sydvendte skråninger, sandede brakmarker, tørre enge og overdrev med sol. Edderkoppen spinder et 30-40 cm stort hjulspind lavt over jorden, hvor den sidder i midten og venter på, at et byttet bliver fanget.

Kendetegn

Hos hvepseedderkoppen er der stor forskel på hannen og hunnen. Hannen er lille og mørk, og hunnen er stor med gul- og sortstribet bagkrop. Midt i hvepseedderkoppens spind er der et zig-zagformet hvidt bånd.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Længde (han): 5-10 mm
Længde (hun): 13-18 mm
Parring: Juli-august
Antal æg: 300-400
Kan ses: Juli-september

Føde

Hvepseedderkoppen lever især af græshopper. De æder også fluer, bier og andre insekter.

Vidste du det?

Efter parringen æder hunnen ofte hannen. Senere på sommeren spinder hunnen en ægkokon, hvor hun lægger æggene i. Hunnen dør selv i løbet af efteråret. Æggene overvintrer i kokonen, og klækkes først til foråret. Ungerne bliver kønsmodne i løbet af sommeren og er klar til at parre sig.

Korsedderkop


Latinsk navn: *Araneus diadematus*

Engelsk navn: Gardenspider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Hjulspindere



Korsedderkoppen er udbredt i hele Danmark og den er en af de mest almindelige hjulspindere, som vi ser i skoven. Den spinder sit store hjulspind mellem grene eller stammer fra buske og lave træer.

Kendetegn

Korsedderkoppen kendes bedst på oversidens lyse mønster, som ofte ligner et kors. Kropsfarven kan variere mellem sort, grå, rød, brun, grøn og gul. Bagkroppen er som regel meget tydelig trekantet og spids bagtil.

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Længde (han): 8 mm
Længde (hun): 8 mm
Parring: August-september
Æg: 300-800
Maks. levealder: 1 år

Føde

Korsedderkoppen er et rovdyr. Den bygger hver nat et hjulspind, hvor den fanger forskellige insekter.

Vidste du det?

Korsedderkoppen sidder mellem planterne uden for sit spind og venter på bytte. Den har en tråd, som forbinder den med spindet. Når et insekt går i nettet, mærker korsedderkoppen det, og den farer hen og lammer byttet med sin gift, hvorefter den spinder det ind.

Krabbeedderkop


Latinsk navn: *Xysticus cristatus*

Engelsk navn: Crab spider

Klasse: **Spindlere**

Orden: **Edderkopper**

Familie: **Krabbeedderkopper**



Krabbeedderkoppen har fået sit navn, fordi den ligner en lille krabbe og også bevæger sig nogenlunde som en krabbe. Krabbeedderkoppen findes overalt i Danmark. Den kaldes også kamæleon-edderkoppen, fordi den kan skifte farve.

Kendetegn

Hunnen er som regel lysegul eller hvid med nogle brunlige pletter på bagkroppen. Hunnen er tre gange så stor som hannen.

Føde

Krabbeedderkoppen lever af insekter, og den er mest aktiv, når insekterne flyver fra blomst til blomst i solskin. Den sidder ganske stille i en blomst og venter på et bytte, som den griber og lammer med lynets hast. Den kan fange store byttedyr, bl.a. sommerfugle og humlebier.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Kropslængde (han): 3 mm
Kropslængde (hun): 10 mm
Parring: Juni-august
Æg: Overvintrer
Levetid: 1 år

Vidste du det?

Krabbeedderkoppen kan skifte farve mellem gul, grøn og hvid, alt efter hvilken blomst, den sidder i. Men det varer dog op til to døgn, før farven har ændret sig. Til gengæld er krabbeedderkoppen godt skjult i blomsten, hvor den nemt fanger insekter og smådyr.

Kvadratedderkop

Latinsk navn: *Araneus quadratus*

Engelsk navn: Four Spot Orb Weaver

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Hjulspindere



Kvadratedderkoppen er en stor edderkop. Den er almindelig overalt i Danmark, men den foretrækker tørre lokaliteter, fx heder og marker. Den træffes også ofte i lysninger i skovene, hvor den har bygget sit hjulspind mellem småbuske og træer i ca. 80 cm højde.

Kendetegn

Kvadratedderkoppen kendes på sin størrelse og på de fire hvide pletter på overkroppen. Kropsfarven kan variere i gule, røde brune, grønne og sorte nuancer.

Fakta

Levesteder: Skoven
Længde (hun): 20 mm
Længde (han): 8 mm
Parring: Juli-september
Æg: Op til 1.000

Føde

Kvadratedderkoppen er et rovdyr. Den fanger flyvende og springende insekter og smådyr i sit store hjulspind.

Vidste du det?

Kvadratedderkoppen sidder ikke inde i sit spind og venter på bytte. Den gemmer sig i en lille hule, den har spundet i kanten af spindet og farer frem, hvis et bytte går i spindet. Byttet dræbes med gift og spindes ind. Derefter tager kvadratedderkoppen sit bytte med til sin hule, hvor den suger saften ud af det.

Mariehøneedderkop

Latinsk navn: *Eresus sandaliatus*

Engelsk navn: Ladybird Spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Rørkartespindere



Mariehøneedderkoppen er ret sjælden i Danmark og findes kun i Jylland. Edderkoppen kræver sol og varme, og den lever på sydvendte, sandede skråninger, heder og i lyngbakker. Mariehøneedderkopper lever nede i jorden i et lodret, rørformet silkespind med et fladt fangstspind over åbningen.

Kendetegn

Kønsmodne hanner har rød bagkrop med sorte pletter og sorte ben med blåhvide striber. Hunnen og ungerne er helt sorte. Mariehøneedderkopper har kraftige kæber.

Føde

Mariehøneedderkopper æder løbebiller, skarnbasser og andre biller. Når et bytte sidder fast i fangstspindet, lammer edderkoppen det med gift og trækker det med ned i røret.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Længde (han): 6-11 mm
Længde (hun): 10-16 mm
Parring: April-maj
Antal æg: 35-80
Kan ses: April-maj

Vidste du det?

Hunnen lever hele livet under jorden, men kønsmodne hanner går på vandring efter hunner i april og maj. I disse måneder kan man være heldig at se hannen. Efter parringen bliver hannen ædt af hunnen. Når æggene klækkes, dør hunnen, og ungerne æder hende.

Orange hjulspinder


Latinsk navn: *Araneus alsine*

Engelsk navn: Strawberry Spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Hjulspindere



Orange hjulspinder er meget sjælden i Danmark, og den findes kun få steder i Jylland. Hjulspinderen lever i løvskove, moser, skovlysninger og på enge og brakmarker. Den spinder et lille hjulspind af fine, tynde tråde lavt over jorden. Edderkoppen gemmer sig i et sammenrullet blad midt i spindet og kommer kun frem, når der er fangst.

Kendetegn

Den orange hjulspinder har en stor, rund, rød eller orange bagkrop med mange, små, hvide eller gullige pletter. Hunnen er meget større end hannen.

Føde

Orange hjulspinder fanger og æder græshopper, fluer og andre insekter.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Længde (han): 5-6 mm

Længde (hun): 9-13 mm

Parring: Juni-juli

Kan ses: Sommer-efterår

Vidste du det?

Edderkoppens orange-røde bagkrop med små hvide eller gule pletter minder lidt om et jordbær. Derfor kaldes arten "Strawberry Spider" på engelsk.

Rovedderkop

Latinsk navn: *Pisaura mirabilis*

Engelsk navn: Nursery Web Spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Rovedderkopper



Rovedderkoppen er meget almindelig og udbredt i hele Danmark. Den findes især på enge og i åbne skove, men kun på steder med høj vegetation. Rovedderkopper spinder ikke net men jager i stedet insekter og smådyr på planterne. Rovedderkopper kan bevæge sig meget hurtigt.

Kendetegn

Rovedderkoppen er meget langstrakt med lange ben. Den er lys brun eller rødbrun. Midt på oversiden af forkroppen har den en lys stribe.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Sø og vandløb
Længde (han): 12 mm
Længde (hun): 15 mm
Parring: Maj-august
Antal kuld: 2
Levealder: Max 3 år

Føde

Rovedderkopper angriber byttet, der færdes på planterne, hvor den lever. Den er i stand til at nedlægge store bytte-dyr som biller, hvepse og sommerfugle.

Vidste du det?

Rovedderkoppen jager ved hjælp af synet, og den kan se et bytte på lang afstand. Den lister sig lydløst ind på sit bytte og kaster sig over det, hvorefter den lammer det med sine giftkroge og suger saften ud af det.

Smaragdedderkop


Latinsk navn: *Micrommata virescens*

Engelsk navn: Green huntsman spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Kæmpekrabbedderkopper



Smaragdedderkoppen findes spredt i hele Danmark, den er dog ret sjælden. Edderkoppen lever i fugtige moser, på marker og enge eller i skovlysninger. Levestederne skal være lune og i læ. Hunnerne forsvare aggressivt deres æg og unger mod fjender. Ungerne overvintrer til næste forår/sommer.

Kendetegn

Hunnen er lysegrøn med mørkegrønne aftegninger, mens hannen har en mørkegrøn forkrop og en gul bagkrop med en rød stribe. Smaragdedderkoppen har 8 lange, grønne ben samt 8 sorte og hvide øjne. Ungerne er grønne eller gule.

Føde

Smaragdedderkoppen lever af andre edderkopper, insekter samt andre smådyr. Byttet bedøves med edderkoppens stærke gift.

Fakta

Levesteder:
Sø og vandløb
Længde (han, uden ben): 7-10 mm
Længde (hun, uden ben): 10-17 mm
Parring: maj-juni
Antal æg: ?
Hannerne dør i juni
Hunnerne dør i løbet af efteråret

Vidste du det?

Smaragdedderkoppen opholder sig i græsset eller i anden lav vegetation som buske og små træer. Her kamuflerer de grønne farver den, hvilket gør, at den let kan fange andre insekter uden at lave et spind. Kamuflagen er en god beskyttelse mod fjender.

Stor springedderkop

Latinsk navn: *Marpissa muscosa*

Engelsk navn: **Jumping spider**

Klasse: **Spindlere**

Orden: **Edderkopper**

Familie: **Springedderkopper**



Der findes mange forskellige **springedderkopper**. De fleste af dem er ganske små. Stor springedderkop holder især til på træstammer, som Solen falder på, men de træffes også på bygninger.

Kendetegn

Springedderkopper har korte, kraftige ben, som er næsten lige lange. Forkroppen er bredest fortil, og den har en kraftig pande, hvor de otte øjne er placerede – fire fremadrettede, hvoraf de to er særlig store. Springedderkopper har derfor et særdeles godt syn.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Længde (han):
6-8 mm
Længde (hun):
8-11 mm

Føde

Stor springedderkop er et rovdyr, der især spiser insekter og smådyr, som den fanger ved at springe frem fra et skjul og gribe og lamme byttet med sin gift.

Vidste du det?

Springedderkopper ser vi ofte i vore huse, hvor de jager insekter, fx i vindueskarmen. Ud over stor springedderkop er zebraedderkoppen meget almindelig.

Vandedderkop

Latinsk navn: *Argyroneta aquatica*

Engelsk navn: Water spider

Klasse: Spindlere

Orden: Edderkopper

Familie: Vandedderkopper



Vandedderkoppen findes i hele landet, men er dog ret sjælden. Den lever i lune, små lavvandede søer, damme og vandhuller med mange vandplanter. Vandedderkoppen spinder "dykkerklokker", som fyldes med luft fra overfladen.

Kendetegn

Vandedderkoppen er brun, og bagkroppen er dækket af små, korte hår. De 8 lange ben er også behårede. På bagkroppen har edderkoppen lange hår, som kan danne et hulrum, der kan fyldes op med luft. Hannen er større end hunnen.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde (han): 16-20 mm
Længde (hun): 12-14 mm
Parring: ?
Antal æg: ca. 100
2 gange pr. år
Kan ses: forår-efterår

Føde

Vandedderkoppen æder vandbænkebidere samt vandinsekter, krebsdyr og larver. Edderkoppen bedøver sit bytte med gift.

Vidste du det?

Vandedderkoppen både æder, overvintrer og parrer sig inde i dykkerklokken, der kan have en diameter på op til 3 cm. Når der ikke er mere luft tilbage i klokken, laver edderkoppen en ny. Vandedderkoppens bid er giftigt og smertefuldt.