

Almindelig tangnål

Latinsk navn: *Labrus bimaculatus*

Engelsk navn: Deep snouted pipefish

Klasse: Fisk

Orden: Nålefinnede fisk

Familie: Nålefisk



Almindelig tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre farvande. Den lever ofte langs kyster eller ved strandkanten, hvor vanddybden ikke er over 20 meter. Tangnålen lever mellem tang, ålegræs og anden vegetation, hvor den står helt stille lodret i vandet, mens den venter på et bytte. Tangnålen svømmer ikke særligt godt.

Kendetegn

Tangnålen er en lille, langstrakt fisk, men en meget lang, tynd, rørformet snude eller mund. Fisken har, til forskel fra andre nålefisk, finner. Tangnålen er oftest stribet brun og grøn, men den kan skifte farve og tilpasse sig omgivelserne.

Føde

Almindelig tangnål suger vand ind gennem munden, hvor vandlopper, små krebsdyr, fiskelarver og fiskeyngel filtreres fra og ædes.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 35 cm
(hunnen er noget større end hannen)
Vægt: ?
Æg: 100-700
Cyder: I sommerhalvåret
Max levealder: 3 år

Vidste du det?

De almindelige tangnåle har en særlig ynglepleje, hvor det er hannen, der bærer og ruger æggene. Hunnen lægger sine æg i hannens rugepose ved hjælp af et langt rør. Her bliver æggene befrugtet og udruget i løbet af ca. 1 måned. I den første tid efter klækningen kan ungerne søge beskyttelse i hannens rugepose.

Almindelig ulk

Latinsk navn: *Myoxocephalus scorpius*

Engelsk navn: **Sculpin**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Ulkefisk**

Familie: **Ulke**



Almindelig ulk er meget udbredt i alle danske farvande, især på lavt vand. Ulken er en bundfisk, der foretrækker at leve mellem tang og mudder. Den svømmer ret dårligt, og den ligger ofte helt stille på lur efter byttedyr eller svømmer langsomt frem og tilbage. Almindelig ulk kan ses hele året.

Kendetegn

Den almindelige ulk har et stort, bredt hoved med en meget stor mund samt pigge og benknuder. Den har desuden meget kraftige pigstråler i finnerne. Ulken er normalt grøn, brunlig eller brungul. I parringstiden er hannens bug dog rødlig med hvide pletter.

Føde

Ulken er nærmest altædende, men den tager især små krebsdyr, småfisk, fiskeyngel og fiskerogn.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 60 cm, normalt dog kun op til ca. 25-30 cm.
Vægt: ?
Æg: Op til 2500-3000
Gyder: Vinter-forår
Levealder: ?

Vidste du det?

Den almindelig ulk parrer sig om vinteren. Hannen holder hunnen fast, mens parringen foregår. Hunnen lægger efterfølgende sine æg i klumper på havbunden på lavt vand. Hannen bevogter æggene, indtil de klækkes efter ca. 5 uger.

Blåstak


Latinsk navn: **Labrus bimaculatus**

Engelsk navn: **Cuckoo wrasse**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Læbefisk**



Blåstak er almindeligt udbredt i Danmark i Nordsøen, Kattegat og i den vestlige Østersø. Fisken lever i kystnære områder med stenrev, klipper og alger eller på sandbund med ålegræs. Den foretrækker områder, hvor vandet er 2-200 meter dybt.

Kendetegn

Blåstak er en slank læbefisk med et spidst hoved og en stor mund med små, spidse tænder og tykke læber. Hannen er blå og sort på sider, hoved og ryg med stærke blå striber. Bugen og finnespidserne er orangerøde. De unge hanner er røde.

Føde

Blåstakken finder sin føde på bunden, hvor den ofte plukker krebsdyr, orme, snegle og muslinger af tang og sten.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde (blåstak): Op til 40 cm

Længde (rødnæb): Op til 30 cm

Vægt (blåstak): Op til 1 kg

Blåstakken er hermafrodit og kan skifte køn i løbet af sit liv.

Æg: Ca. 1000

Max levealder: 20 år

Vidste du det?

Hunner og unge, røde hanner kaldes rødnæb. Hunnerne er orangerøde og gyldne med tre sorte pletter bagerst på ryggen. Det har de unge, røde hanner ikke. Nogle af hunnerne skifter køn og bliver senere i livet til blå hanner. Når de unge hanner er omkring 7 år gamle, bliver de også blå.

Brisling


Latinsk navn: **Sprattus sprattus**

Engelsk navn: **European sprat**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Sildefisk**

Familie: **Sild**



Brislingen er almindeligt udbredt i alle de danske farvande. Fisken lever i buster og foretrækker kystområder med 5-150 meter dybt. Om vinteren trækker brislingerne dog ud på dybere vand. Brislinger finder både nær bunden, i overfladen og i de frie vandmasser.

Kendetegn

Brislinger ligner sild meget, men de kan kendes på de skarpe savtakkede skæl på bugen, der også har givet brislingen navnet skarpsild. Brislingen er sølvfarvet med et grønligt eller blåligt skær og med en mørkere ryg. Desuden kan brislingen kendes på, at bugfinnerne normalt begynder foran rygfinnens start.

Føde

Brislingens føde består hovedsageligt af plankton og dyreplankton.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Sjældent op til 20 cm, normalt ca. 10-13 cm.
Vægt: ?
Æg: Op til 14.0000
Gyder: Januar-juli
Max. levealder: Ca. 5-7 år

Vidste du det?

I gydeperioden vandrer brislingen til særlige områder, som fx i Skagerrak og i den sydøstlige Nordsø, hvor legen og gydningen foregår. Hunnen gyder sine æg, som er pelagiske, hvilket vil sige, at de flyder frit rundt i vandet. Æggene klækkes efter ca. 1 uge.

Fjæsing


Latinsk navn: **Trachinus draco**

Engelsk navn: **Greater weaver**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Fjæsinger**



Fjæsingen er ret almindelig i Danmark i havområder med 2-30 m dybt, altså ret lavt vand. Forekommer ofte tæt ved kyster og strande. Fisken lever normalt ved bunden, hvor den foretrækker steder med sand og grus. Om efteråret trækker fjæsingerne ud på dybere vand.

Kendetegn

Fjæsinger er slanke og meget langstrakte fisk med opadvendte øjne og kraftigt underbid. Fisken er spraglet og skinnende med blå, grønne, gule og brune farver. Bugen er lys. Fjæsing har desuden pigstråler i den forreste rygfinne og på gællelågende.

Føde

Fjæsingens føde består af krebsdyr og små bundfisk. Den ligger ofte halv nedgravet på bunden og venter på, at et bytte kommer forbi. Om natten jager den i frie vandmasser.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Sjældent op til 45-50 cm
Vægt: Op til ca. 2 kg
Æg: 200-1.000
Cyder: Juni-august
Max levealder: ?
Kan ses hele året

Vidste du det?

Fjæsingens kraftige pigstråler er giftige. Giften beskytter mod fjender, men de er også meget ubehagelige for mennesker, der er uheldige at træde på en nedgravet fjæsing på stranden. Man bør derfor straks søge læge, hvis man stikkes af en fjæsing, som er den eneste giftige fisk i Danmark.

Grundling

Latinsk navn: *Gobio gobio*

Engelsk navn: **Gudgeon**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Grundlingen er mest udbredt på Sjælland og i Midt- og Østjylland. Fisken lever i langsomt strømmende og rene vandløb, i søer nær ved søbredden samt i brakvand. Grundlingen lever ofte i små stimer på meget lavt vand.

Kendetegn

Grundlingen har en lang og slank krop. Den er sølvfarvet, men noget mørkere på ryggen. På de blanke, sølvfarvede sider er der mørke skjolder samt en tydelig sidelinje. Man kan desuden kende grundlingen på de to skægtråde, der sidder i hver sin mundvig. I gydetiden får hannen vorter på hovedet.

Føde

Grundlinger lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver og små krebsdyr samt halvrådnede plantedelev.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: Ca. 12-20 cm

Vægt: Op til 200 g

Æg: 3000

Gyder: Maj-juni

Levealder: Ca. 6 år

Vidste du det?

Grundlingen gyder om sommeren på lavt vand mellem sten og planter. Efter ca. 15-30 dage klækkes æggene, og de nye fisk slutter sig til de ældre artsfæller, som lever nær bunden.

Grå knurhane


Latinsk navn: *Eutrigla gurnardus*

Engelsk navn: Grey gurnard

Klasse: Fisk

Orden: Ulkefisk

Familie: Triglidae



Grå knurhane er meget almindelig udbredt i alle danske farvande indtil Øresund. Knurhanen er en bundfisk, der lever på blød mudder- eller sandbund på 10-150 meters dybde. Fisken trives dog også i de øvre vandlag. Ynglen lever frit i vandet, indtil den opnår en længde på 2-3 cm. Æggene flyder ligeledes frit i vandet.

Kendetegn

Den grå knurhane er en langstrakt fisk med et kraftigt hoved, som er dækket af benplader. Ryggen og siderne er gråbrune eller rødbrune med små, lyse pletter. Bugen er lysere. Derudover har fisken bentorne langs sidelinien og pigge i den forreste del af rygfinnen. Den grå knurhane kan desuden "knurre".

Føde

Grå knurhane lever af småfisk og små bunddyr som krebsdyr og orme.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til ca. 45-50 cm
Vægt: Op til ca. 1,2 kg
Æg: 200.000-300.000
Gyder: April-august
Max levealder: Ca. 6 år
Kønsmoden efter ca. 3-4 år

Vidste du det?

Grå knurhane har forlængede finnestråler i brystfinnerne. Disse bruges som ben, når fisken bevæger sig på bunden, og de fungerer som en slags følehorn, når fisken leder efter mad. Brystfinnerne er meget store og både halefinnen og gatfinnen er ret lange.

Havbars


Latinsk navn: *Dicentrarchus labrax*

Engelsk navn: European seabass

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Moronidae



Havbarsen findes i de danske farvande indtil omkring Øresund og Bælthavet. Fisken trives fint i brakvand. Havbarsen er normalt en stimefisk, der lever nær overfladen ved kysten. Om vinteren trækker den dog ud på dybt vand indtil 75 meters dybde.

Kendetegn

Havbarsen har skinnende, sølvfarvede sider og blågrå eller grønlig ryg. Både sider og ryg kan have et brunligt skær. Den forreste rygfinne består af pigge, mens den bageste er blød. På gællelåget har fisken desuden en sort plet og to pigge.

Føde

Havbars lever af småfisk, bløddyr, orme, blæksprutter og krebsdyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til 12 kg

Æg: ?

Gyder: Marts-august

Max levealder: ?

Vidste du det?

Havbarsen er en meget værdsat spisefisk, som også opdrættes til kommercielt brug i en stor del af sit udbredelsesområde.

Havkarusse

Latinsk navn: *Ctenolabrus rupestris*

Engelsk navn: Crucian carp

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Læbefisk



Havkarussen er almindeligt udbredt i Danmark langs kysterne på ret lavt vand. Havkarussen lever i småflokke på 3-5 fisk. Den foretrækker områder med ålegræs, sten og klipper, hvor den kan gemme sig i huller og revner. Om vinteren trækker karussen ud på dybere vand.

Kendetegn

Havkarussen er mørkebrun, rødbrun eller gulbrun med metalglinsende striber eller pletter og med en hvidlig bug. Fisken har både en sort plet forrest på den lange rygfinne og en på oversiden af haleroden. Havkarussen har desuden tykke læber og små tænder på kæberne.

Føde

Havkarusser lever af krebsdyr og bløddyr samt snegle, rurer og andre smådyr, som den plukker af sten og tang.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til ca. 20 cm
Vægt: Op til 100 g
Æg: ?
Cyder: Sommer
Max levealder: ?

Vidste du det?

Om sommeren er hannen rødlig på bugen, og hunnen får mørkebrune striber. Hannen forsvare sit område mod andre fisk, og hunnen besøger selv hannens område, når hun vil. Her leger og gyder fiskene. Æggene svæver frit i vandet.



Havkat

Latinsk navn: *Anarhichas lupus*

Engelsk navn: Seawolf

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Havkatte



Havkatten er ret almindelig i hele Danmark. Fisken lever i havområder, hvor vandet er 20-400 m dybt. Havkatten foretrækker fast havbund med stenrev og klipper, hvor den jager ved at ligge stille på bunden eller ved at glide langsomt rundt mellem sten og tang. Havkatte kan ses hele året og lever normalt enkeltvis.

Kendetegn

En havkat er en langstrakt fisk med et stort hoved og lang ryg- og gatfinne. Fisken er grålig eller gråblå med mørkere tværstriber og lys bug. Havkatten har nogle meget kraftige kæber, en afrundet snude og et uhyggeligt tandsæt.

Føde

Havkatte æder muslinger, snegle, søpindsvin og krebsdyr. Skallerne knuses med fiskens kraftige tænder, der udskiftes hver vinter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 130 cm, normalt dog kun ca. 50-60 cm
Vægt: Op til ca. 20 kg
Æg: 3.000-25.000
Cyder: Vinter
Max. levealder: 14 år
Kønsmoden som 6-7 årig

Vidste du det?

Havkatte gyder om vinteren, hvor de forholdsvis store æg på 5-6 mm lægges i store klumper på havbunden. Hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter 2-3 måneder. De første par måneder lever ynglen i vandet og søger først senere ned på bunden og lever som bundfisk.



Havlampret

Latinsk navn: *Squalus acanthias*

Engelsk navn: **Spiny dogfish**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Lampretter**

Familie: **Lampretter**



Havlampret forekommer nu relativt sjældent i Danmark, men den var tidligere vidt udbredt i de fleste danske farvande. Den findes nu især i det vestlige og nordlige Jylland. De voksne havlampretter lever størstedelen af deres liv i havet, men de trækker op i vandløb for at gyde.

Kendetegn

Havlampretten er en langstrakt, sortplettet fisk med en stor, rund sugemund besat af hornetænder. Bag hvert øje har fisken også syv tydelige gælleåbninger. Desuden har fisken to rygfinner bagest på kroppen.

Føde

Havlampretter er ådselædere eller blodsugere, der kan suge sig fast på andre værtsfisk. Den udskiller et særligt enzym, der opløser værtsfiskens væv og forhindrer blodet i at størkne.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til 2,5 kg

Æg: 200.000-240.000

Gyder: Forår

Bliver kønsmoden efter ca. 3-4 år

Max levealder: ?

Vidste du det?

Når havlampretter er blevet kønsmodne, trækker de op i åer og floder for at gyde. Normalt gyder de på sandet og stenet bund. De voksne fisk dør efter gydningen. Larverne, der også kaldes hørål, lever de første par år på bunden i vandløbene. Først derefter søger de ud i havet.

Havørred

Latinsk navn: **Salmo trutta**

Engelsk navn: **Sea trout**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Laks**

Familie: **Laks**



Havørreden er en udpræget vandrefisk. Det er den mest almindelige og udbredte form af ørreder i Danmark (se ørred). Havørreden vandrer ud i havet, hvor den lever, men den vender tilbage til ferske vandløb og åer i gydetiden.

Kendetegn

Havørreder er sølvblanke med mørk ryg, men når de foretager gydevandring ind i vandløb, bliver de meget mørkere. Desuden har havørreden sorte eller rødlige pletter på hele kroppen. Ørreder er generelt slanke, torpedofromede fisk med plump halefinne og en lille fedtfinne. Havørreden er normalt den største af de danske ørreder.

Føde

Havørreder lever af små krebsdyr, som rejer og tanglopper, samt forskellige småfisk.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Længde: Op til 140 cm
Vægt: Op til 18 kg
Æg: ?
Gyder: ?
Levealder: Normalt ca. 4-6 år, max 12-18 år

Vidste du det?

Ørreder er på grund af nogle specielle kirtler i stand til at regulere saltmængden i kroppen. Dette er grunden til, at nogle ørreder lever i ferskvand og andre i saltvand. Det er også denne særlige tilpasningsevne, der gør det muligt for havørreden at foretage gydevandring ind i vandløb.

Havtaske


Latinsk navn: *Lophius piscatorius*

Engelsk navn: Angler

Klasse: Fisk

Orden: Lophiiformes

Familie: Lophiidae



Havtasken er en almindelig fisk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Den lever normalt på 20-1.000 meters dybde på havbunden, i gydeperioden dog på op til 1.800 meter dybt vand. Havtaskens æg gydes i op til ti meter lange violette, slimede bånd.

Kendetegn

Havtasken er en flad, bred bundfisk med et stort hoved. Oversiden er knudret og ofte mørkebrun og sort. Undersiden er hvid. Havtasken har et kraftigt underbid og spidse tænder. På fiskens sider er der nogle små hudvedhæng. Havtaskens tre forreste finnestråler i rygfinnen er fritstående. De store brystfinner bruges, når fisken bevæger sig rundt på bunden.

Føde

Havtasker lever af fisk og havfugle, og de kan tage ret store byttedyr, der sluges hele.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 190 cm
Vægt: Op til ca. 50 kg
Æg: Ca. 1.000.000
Gyder: Forår-sommer
Max levealder: ?

Vidste du det?

Havtasken jager, mens den ligger halvt begravet på havbunden, hvor den med sin flade kropsform og farve er særdeles godt kamufleret. Mens havtasken ligger der, bevæger den sin forreste frie finnestråle, hvor der sidder en lille dusk. Dusken ligner lidt mad, og den lokker byttedyr lige hen til havtaskens store gab.

Hornfisk

Latinsk navn: **Belone belone**

Engelsk navn: **Garfish**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Hornfisk**

Familie: **Hornfisk**



Hornfisken er almindelig i alle de danske farvande i marts-oktober. Hornfisken kommer til Danmark for at gyde, hvilket sker på lavt vand langs kysterne. Om efteråret vandrer fiskene til farvandet sydvest for De Britiske Øer, hvor de overvintrer. Hornfisk lever frit i vandet i stimer.

Kendetegn

Hornfisken har en langstrakt, tynd krop. Ryg- og gatfinnen sidder meget langt tilbage på kroppen. Fiskens ryg er mørk blålig eller grønlig, hvorimod siderne er sølvfarvede. Hornfisken har lange kæber, der er besat af små, spidse tænder. Hornfiskens ben er grønlig på grund af et stort indhold af jernsulfat.

Føde

Hornfisk lever af fisk, blæksprutter og krebsdyr, som de jager i de fire vandmasser. Hornfisken jager om dagen.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til ca. 120 cm
Vægt: 1-2 kg
Æg: Op til 350.000
Gyder: Maj-juli
Bliver kønsmodne efter 2 år
Max levealder: 18 år

Vidste du det?

Hornfisk formerer sig på lavt vand, hvor hannerne ofte er flere om én hun. Ynglen har, når de kommer ud af æggene efter 3-5 uger, intet næb. Næbbet udvikles først senere. Underkæben vokser noget hurtigere end overkæben. I løbet af det første år bliver de små hornfisk 20-25 cm lange.

Hvilling


Latinsk navn: **Merlangius merlangius**

Engelsk navn: **Whiting**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Torskefisk**

Familie: **Torsk**



Hvillingen er almindelig torskefisk i de danske farvande indtil den vestlige Østersø. Fisken lever i stimer både ved bunden og i de frie vandmasser på 10-200 meters dybde. Hvillingerne samler sig i store gydestimer og vandrer fra de indre danske farvande til gydeområder i Nordsøen og Skagerrak.

Kendetegn

Hvillinger er lysegrå eller lys blågrønne med en mørkere ryg. Ved roden af brystfinnen har fisken en sort plet. Hvillingen har desuden en stor mund med overbid og nogle lange, spidse tænder. Gattet er placeret under midten af den forreste rygfinne. Hvillingen kan desuden have en meget lille skægtråd.

Føde

Hvillingen lever af fiskeyngel, krebsdyr og fisk.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 70 cm, dog sjældent over 40 cm
Vægt: Op til ca. 3-4 kg
Æg: 100.000-1.000.000
Gyder: Januar-september
Bliver kønsmoden efter 2-4 år
Max levealder: Ca. 20 år

Vidste du det?

Hvillingen gyder kun sjældent i de indre danske farvande, men alligevel optræder store mængder af helt unge hvillinger i de indre farvande. De føres nemlig med strømmen ind mod kysten. Her lever de små fisk på ret lavt, indtil de bliver kønsmodne.

Kuller


Latinsk navn: *Melanogrammus aeglefinus*

Engelsk navn: Haddock

Klasse: Fisk

Orden: Torskefisk

Familie: Torsk



Kulleren findes i de danske farvande indtil Øresund og Bælthavet. Fisken gyder især i Nordsøen. Kulleren er en bundfisk, der lever på 10-450 meters dybde. Den foretrækker en vandtemperatur på 4-10 grader. Kullere lever og jager i stimer på bunden.

Kendetegn

Kulleren er gråbrun med sølvgrå bug samt en mørk sideline og en stor, kulsort plet over brystfinnen. Den forreste rygfinne er høj og spids, og øjnene er store. Derudover har fisken en lille skægtråd på hagen, som bruges til at finde føde på bunden. Munden er lille med overbid.

Føde

Kullernes føde består af forskellige bunddyr som orme, bløddyr, pighude, krebsdyr, fiskerogn og fisk. Ynglen lever også af plankton.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til ca. 14 kg

Æg: Op til 1.800.000

Gyder: Marts-juni

Kønsmoden efter 3-4 år

Max. levealder: ?

Vidste du det?

Kulleren gyder på bunden i 50-150 meter dybt vand. Hunnens æg flyder efter befrugtningen op til vandoverfladen. Æggene klækkes efter 1-3 uger. Larverne flyder også rundt med strømmen den første tid. Men når de små larver er blevet ca. 5-10 cm lange, søger de ned mod bunden.

Kulmule


Latinsk navn: **Merluccius merluccius**

Engelsk navn: **Hake**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Torskefisk**

Familie: **Merluccidae**



Kulmulen findes i de danske farvande indtil Øresund og bælteerne. Fisken er mest talrig i Nordsøen og det nordlige Skagerrak og mere sjælden i de indre farvande. Kulmulen lever på ca. 50-500 meter dybt vand. Om dagen holder kulmulen sig ved bunden, men om natten jager den i de frie vandmasser.

Kendetegn

Kulmulen er en langstrakt fisk med sort mund og gællehule. Fisken er normalt sølvgrå med hvid bug og mørkere, plettet ryg. Både mund og øjne er store. Fisken har underbid og lange, spidse tænder. Kulmulen har både en kort og en lang rygfinne samt en lang gatfinne. De små kulmuler har desuden skægtråde.

Føde

Kulmuler lever især af små stimefisk.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 135-140 cm
Vægt: Op til 15 kg
Æg: 2.000.000-7.000.000
Gyder: April-juli
Kønsmoden efter 3-4 år
Max levealder: ?

Vidste du det?

Kulmulens yngel er pelagisk. Det vil sige, at de flyder frit rundt i vandet. Æggene klækkes allerede efter et par dage. De små kulmuler lever af dyreplankton, og de findes ofte på ret lavt vand i kystnære områder. Med tiden trækker fiskene ud på dybere vand.

Lange


Latinsk navn: *Molva molva*

Engelsk navn: Ling

Klasse: Fisk

Orden: Torskefisk

Familie: Torsk



Langen er almindelig i de danske farvande indtil Bornholm. Fisken foretrækker dybt vand på åbent hav og hård bund med stenrev og klipper. Langen lever oftest på 100-400 meters dybde nær bunden. Langen gyder normalt ikke i Danmark.

Kendetegn

Langer er meget lange, smidige fisk, der kan sno sig mellem stenrev og klipper. Fiskens farve varierer, men er ofte brunlig eller grålig med mørkere ryg og lys bug. Langen har både en kort og en lang rygfinne samt en lang gatfinne. Finnekanterne er hvide. Derudover har fisken en lang skægtråd på hagen.

Føde

Langen lever af krebsdyr, fisk, bløddyr, søstjerner og blæksprutter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 200 cm

Vægt: Op til 45 kg

Æg: 20-60 millioner

Gyder: April-juni

Kønsmoden efter 6-8 år

Max levealder: 25 år

Vidste du det?

Langen har et stort gab med overbid og sluger ofte sit bytte helt. Langens skægtråd og dens store øjne hjælper fisken med at finde føde på bunden af det dybe og mørke vand. Skægtråden er meget følsom og kan bl.a. opfange lugten fra de forskellige bunddyr.

Makrel

Latinsk navn: **Thunnus thynnus**

Engelsk navn: **Bluefin tuna**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Makrel**



Makrel er meget almindeligt udbredt i alle de danske farvande. Makrellen er en vandrefisk, der kommer til Danmark om foråret for at gyde. Æg og sæd gydes frit i vandoverfladen, hvor æggene bliver liggende. Makrelfiskene lever og jager i meget store stimer i de frie vandmasser.

Kendetegn

Makrellen er en lille, slank og torpedoformet fisk, der svømmer rigtig godt. Den er grøn og blå med mørke striber over ryggen. Siderne og bugen er lysere. Makrellen har desuden nogle helt små finner foran halen.

Føde

Makrel lever af småfisk, som den fanger med sine små gribetænder, samt små krebsdyr og dyreplankton, som den sier fra vandet ved hjælp af et gællegitter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 60 cm, men sjældent over 30 cm
Vægt: Op til ca. 3 kg
Æg: Ca. 400.000
Gyder: Maj-juli
Max levealder: 17 år
Kan ses forår-efterår

Vidste du det?

Der findes to bestande af makrelfisk i Danmark. Den ene kaldes "nordsø-makrellen", og den overvintrer i Nordsøens nordlige del. Den anden kaldes "vestmakrellen," og den overvintrer ved Irlands vestkyst. Makrelfiskene overvintrer på dybt vand, hvor de står passivt uden at tage føde til sig.



Pighaj


Latinsk navn: *Squalus acanthias*

Engelsk navn: **Spiny dogfish**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Squaliformes**

Familie: **Squalidae**



Pighajen er meget almindeligt udbredt i de danske farvande indtil den vestlige Østersø. Hajen lever i store stimer på ca. 10-400 meters dybde. Den foretrækker blød bund og en vandtemperatur på 6-15 grader. Pighajen er en vandrefisk, der findes i Danmark efter-forår. Pighajen lægger ikke ægkapsler, men føder levende unger.

Kendetegn

Pighajen er en lille, slank haj med 5 gællespalter foran brystfinnen og en afrundet snude. Hajen er grålig med lysere, hvidplettede sider og en hvidlig bug. Pighajen har desuden en kraftig giftpig i hver rygfinne. Hajen har ingen gatfinne.

Føde

Hajen lever af forskellige småfisk, krebsdyr, blæksprutter og gopler.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde (han): Op til 90 cm
Længde (hun): Op til ca. 130 cm
Vægt (han): Op til 7 kg
Vægt (hun): Op til 10 kg
Drægtighed: 18-22 måneder
Kuldstørrelse: 4-12 unger
Længde (unger): 20-33 cm
Max levealder: 75 år
Kønsmoden efter 9-14 år

Vidste du det?

Pighajer lever og jager både nær bunden og i de frie vandmasser. Når hajerne jager, gør de især brug af deres store, gule øjne og deres fantastiske gode lugtesans. Selv om pighajen er en grådig rovfisk med skarpe tænder, er den ikke farlig for mennesker.

Sandkutling

Latinsk navn: *Pomatoschistus minutus*

Engelsk navn: Sand goby

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Kutlinger



Sandkutlingen er en bundfisk, der er meget almindelig ved alle de danske kyster på ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken optræder normalt enkeltvis eller i småstimer. Sandkutlinger foretrækker sandbund, hvor de kan grave sig ned og ligge på lur efter byttedyr.

Kendetegn

Sandkutlingen er en lille, lys bundfisk med mørke pletter eller striber på siderne. Fisken har også en lille mørk plet bagest på den forreste rygfinne. Kutlingernes bugfinner er vokset sammen til en sugeskive, som holder fiskene fast på bunden. Fisken har desuden pigge i den forreste rygfinne.

Føde

Sandkutlinger lever af smådyr som krebsdyr, orme, unger af muslinger og snegle samt fiskeyngel. Kutlingernes yngel lever af plankton.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til ca. 10 cm

Vægt: ?

Æg: ?

Gyder: Marts-august

Bliver kønsmoden efter 1-2 år

Max levealder: 3 år

Vidste du det?

I gydeperioden finder hannen en tom muslingeskal eller et andet hulrum på bunden, som han lokker hunnen ind i. Her lægger hunnen sine æg, hvorefter hannen gyder sin sæd over æggene. Derefter er det udelukkende hannen, der passer på æggene. Æggene klækkes efter ca. 14 dage.

Sej


Latinsk navn: *Pollachius virens*

Engelsk navn: Pollock

Klasse: Fisk

Orden: Torskefisk

Familie: Torsk



Sejen er meget almindelig i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat, men den forekommer mere spredt i de indre danske farvande. Fisken lever i stimer i de frie vandmasser eller nær bunden ned til ca. 250 meters dybde.

Kendetegn

En sej kan kendes på den næsten helt lige, hvide sidelinie. Sejen er en blank fisk, der er lysgrå eller hvidlig på bugen og mørk blågrøn eller brunlig på ryggen. Finnerne er også mørke. Fisken har desuden underbid og mangler skægtråd som voksen.

Føde

Sejen jager ofte stimer af andre fisk. Den tager også fiskeyngel, mindre blæksprutter og planktonkrebsdyr, der filtreres fra vandet med fiskens gællegitter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 130 cm
Vægt: Op til ca. 17-30 kg
Æg: Ca. 3.000.000-4.000.000
Cyder: Februar-april
Bliver kønsmoden efter 4-5 år
Max levealder: 25-30 år

Vidste du det?

Sejen gyder i de frie vandmasser, ofte på dybt vand. Både æg og yngel flyder frit rundt i vandet (dvs. de lever pelagisk). Efter noget tid søger ynglen mod bunden og trækker ind mod kysterne. Sejen kan desuden foretage længere gyde- eller ædevandring.

Sild


Latinsk navn: **Clupea harengus**

Engelsk navn: **Herring**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Sildefisk**

Familie: **Sild**



Sild er meget almindeligt udbredt i alle de danske farvande. Den lever i de frie vandmasser (pelagisk) fra overfladen ned til ca. 250 meters dybde. Fiskerne står ofte dybere i vandet om dagen end om natten. Sild er meget udprægede stimefisk, der optræder i kæmpestore stimer, der også kaldes "sildebjerger".

Kendetegn

Silden er sølvskinnende med et blåligt, violet eller grønligt skær. Kroppen er slank og sækket af store, løse skæl. Fisken har store øjne og en lille mund med underbid. Derudover har silden en kort rygfinne uden pigstråler. Bugfinnerne sidder under rygfinnen. Sild har ingen sidelinie.

Føde

Sild lever hovedsageligt af plankton, som filtreres fra vandet med fiskens gællegitter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 50 cm, men normalt ca. 15-25 cm

Vægt: Op til 1 kg, men normalt 150-400 g

Æg: 20.000-150.000

Gyder: Vinter eller efterår

Bliver kønsmoden efter 2-9 år

Max levealder: 22-25 år

Vidste du det?

Der findes forskellige sildestammer, som varierer lidt i størrelse, levevis og har forskellige gyde-perioder. De forskellige sildestammer samles på stammens særlige gydepladser, hvor æggene gydes frit i vandet. Efterfølgende synker æggene ned på bunden, hvor de klæber sig fast til sten, alger og tang og klækkes efter 2-4 uger.

Småplettet rødhaj

Latinsk navn: *Scyliorhinus caniculus*

Engelsk navn: Smallspottet catshark

Klasse: Fisk

Orden: Blinkhindehajer

Familie: Scyliorhinidae



Den småplettede rødhaj er ret almindelig i Skagerrak, Nordsøen og Kattegat indtil Øresund og Bælterne. Hajen foretrækker sand-, grus- og mudderbund samt dybder på 10-100 meter, men kan dog optræde helt ned til 400 meters dybde. Rødhajen jager om natten over bunden eller i de frie vandmasser.

Kendetegn

Småplettet rødhaj er en lille, slank og langstrakt haj med en kort og bred snude og store øjne. Hajen er sandfarvet eller brunlig med nogle mørke eller rødlige pletter. Bugen er lys. Desuden er rødhajen meget ru, da den er dækket af små bentorne i stedet for skæl.

Føde

De småplettede rødhajer finder især deres føde på bunden. Føden består af snegle, rejer, søstjerner, blæksprutter, hummere og småfisk.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: op til 100 cm

Vægt: ?

Ægkapsler: 15-20

Parring: Efterår

Bliver kønsmoden ved en

længde på ca. 50 cm

Max levealder: ?

Vidste du det?

Modsat mange andre fisk, sker der hos småplettede rødhajer en egentlig parring. Derefter gyder hunnen sine æg på bunden, hvor de sætter sig fast i tang og sten med nogle lange tråde. Æggene ligger inde i nogle gulbrune ægkapsler. Æggene klækkes efter 5-11 måneder, og ungerne er ca. 10 cm lange.

Sortkutling


Latinsk navn: *Gobius niger*

Engelsk navn: Black goby

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Kutlinger



Sortkutlingen er en almindelig bundfisk i de indre, danske farvande. Arten lever på blød bund på ret lavt vand (1-50 meters dybde).

Kendetegn

Sortkutlingen er en stor, kraftig kutling. Arten har samme farve som bunden, hvor den lever, dog med mørkere pletter og markeringer. Hannerne er generelt mørke og de største kan være helt sorte. Hannerne har desuden højere rygfinner end hunnerne. Kutlinger har sammenvoksede bugfinner, et bredt hoved og pigge i den forreste rygfinne.

Føde

Kutlinger lever af små hvirvelløse bunddyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 18 cm

Gyder: Sommer

Bliver kønsmoden efter 2 år

Max levealder: Omkring 4 år

Vidste du det?

I gydeperioden afmærker hannen sit territorium og inviterer hunner til at gyde i området. Det er hannen, der herefter vogter over æggene herefter.

Sortmundet kutling


Latinsk navn: *Neogobius melanostomus*

Engelsk navn: Round goby

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Kutlinger



Sortmundet kutling er en såkaldt invasiv art, der første gang blev fanget i Danmark i 2008. Siden er bestanden vokset voldsomt, og sortmundet kutling har siden 2008 også spredt sig til ferskvand. Arten lever på bunden i fersk- og brakvand. Hannen er territorial, og vogter over reden, hvor en eller flere hunner gyder deres æg i.

Kendetegn

Sortmundet kutling er grå-gråbeige med mørkere sorte og brune markeringer. Hannen er mørkere og kan i gydeperioden være helt sort. Kutlinger har pigge i den forreste rygfinne og sammenvoksede bugfinner, som de bruger til at støtte med på bunden.

Føde

Sortmundet kutlinger lever af bløddyr, især muslinger, og andre små hvirvelløse bunddyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Typisk 10-20 cm, men op til 25 cm

Vægt: ?

Æg: Op til 4000 æg over en hel ynglesæson

Hanner bliver kønsmodne efter 3-4 år, hunner efter 2-3 år

Gyder: Maj-september

Levealder (hanner): 4-5 år

Levealder (hunner): 3-4 år

Vidste du det?

Sortmundet kutling er en invasiv art, og den voldsomme vækst i bestanden kan have alvorlige konsekvenser for udviklingen i bestanden af andre arter som rejer, skrubber, ål og ørreder. Sortmundet kutling kommer oprindeligt fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Men mener, at arten er kommet til Østersøen med ballastvand i skibe.

Stenbider

Latinsk navn: *Cyclopterus lumpus*

Engelsk navn: Lumpsucker

Klasse: Fisk

Orden: Ulkefisk

Familie: Stenbidere



Stenbideren er ret almindelig i de danske farvande vinter og forår, hvor den trækker ind til de danske kyster på ret lavt vand for at gyde. Fisken foretrækker hård og stenet bund. Uden for gydetiden lever stenbideren pelagisk (i de frie vandmasser) på dybere vand.

Kendetegn

Hunnen er mørk grålig eller grønlig med lys bug, hvorimod hannen er gråbrun med hvid bug. Hannen får dog rød bug og sider i gydeperioden. Stenbideren har en høj ryg og en kort, plump krop med et par rækker af benknuder. Den forreste rygfinne er dækket af en benkam. Bugfinnerne er desuden vokset sammen til en sugeskive.

Føde

Stenbidere lever af plankton, småfisk, fiskeyngel, gopler, orme og krebsdyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde (han): Op til 40 cm
Længde (hun): Op til 70 cm
Vægt: Op til ca. 5 kg
Æg: Ca. 100.000-350.000
Gyder: Januar-maj
Max levealder: ?

Vidste du det?

Stenbideren gyder på lavt vand på særlige gydepladser. Her afsætter hunnen sine æg i en stor klump på sten eller tang. Æggene er rødlige. Herefter forlader hunnen gydepladsen, og hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter 7-8 uger. Stenbiderens æg spises som kaviar.

Torsk

Latinsk navn: **Gadus morhua**

Engelsk navn: **Cod**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Torskefisk**

Familie: **Torsk**



Torsken er meget almindelig i de danske farvande og fjorde. Generelt lever torsk i stimer nær bunden fra ret lavt vand og ned til ca. 600 meters dybde. Fiskene kan dog også leve pelagisk, altså i de frie vandmasser. Torsken er en meget populær spisefisk.

Kendetegn

Torsken har en kraftig skægtråd på hagen, som hjælper fisken med at finde føde på bunden, tre rygfiner og to gatfiner. Farven varierer alt efter omgivelserne, men torsken har dog normalt mørke prikker, lys sidelinie og lysere bug. Munden er stor og med overbid.

Føde

De mindre torsk lever af krebsdyr og orme, hvorimod de større torsk især tager fisk.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 150 cm
Vægt: Op til 50 kg
Æg: 500.000-9.000.000
Cyder: Januar-april
Bliver kønsmoden efter 2-12 år
Max levealder: ?

Vidste du det?

I Danmark findes der flere forskellige torskestammer. Nogle stammer kan foretage længere gyde- vandringer til helt bestemte gydepladser. Når torsk formerer sig, gyder hannen og hunnen sæd og æg frit i vandet, mens de svømmer bug mod bug. Temperaturen skal helst være 4-6 grader under gydningen.

Tun


Latinsk navn: **Thunnus thynnus**

Engelsk navn: **Bluefin tuna**

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Makrel



Tun lever i ret lunt vand og findes sjældent i Danmark og kun om sommeren. Tunfiskene lever i stimer i de frie vandmasser fra overfladen og ned til ca. 100 meters dybde. Tun foretager gyde- og ædevandring over meget store afstande.

Kendetegn

Tunen er blank med blågrønne sider og blåsort ryg. Bugen er sølvskinnende. Kroppen er kort og ret kraftigt bygget, mens finnerne er smalle og spidse. Bagest på fiskens krop er der nogle små finner. Tunen kan svømme meget hurtigt! Den har verdensrekord blandt fiskene.

Føde

Tun lever af forskellige stimefisk, som jages samtidig af flere tunfisk, som presser stimerne op mod overfladen. De mindre fisk filtreres fra vandet med tunens gællegitter. De større fisk sluges hele.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til ca. 250 cm
Vægt: Op til ca. 300 kg
Æg: Op til 10.000.000
Gyder: Sommer
Bliver kønsmoden efter 3-4 år
Max levealder: ?

Vidste du det?

Tidligere var antallet af tun i de danske farvande væsentligt større end i dag. Overfiskning - især i gydeområderne - har bevirket, at tunen nu er betydeligt mere sjælden i Danmark.

Tyklæbet multe

Latinsk navn: Mugil chelo

Engelsk navn: Mullet

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Mugilidae



Tyklæbet multe er efterhånden blevet ret almindelig i Danmark om sommeren. Multen lever i småstimer på helt lavt vand langs vore kyster. Den kan også trives i brakvandsområder og i vandløb med adgang til havet.

Kendetegn

Den tyklæbede multe er en rund og aflang fisk, der kan kendes på den tykke og vortede overlæbe. Fisken er desuden sølvskinnende med store skæl. Ryggen er blålig eller grå, og bugen er hvid. Den forreste rygfinne har pigstråler.

Føde

Tyklæbede multer lever af alger, plankton, bundplanter og forskellige smådyr som krebsdyr og snegle. Fisken finder føden mellem sten og planter og filtrerer det fra vandet med et tæt gællegitter, der sidder i svælget.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 90 cm
Vægt: Op til ca. 5 kg
Æg: ?
Gyder: ?
Bliver kønsmoden efter 3-4 år
Max levealder: ?

Vidste du det?

Multer kræver ret lunt vand for at formere sig, så den tyklæbede multe yngler kun sjældent eller aldrig ved de danske kyster. Larver af multen lever pelagisk. Det vil sige, at de små larver flyder frit rundt i vandet.

Ålekvabbe

Latinsk navn: *Labrus bimaculatus*

Engelsk navn: Cuckoo wrasse

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Ålekvabber



Ålekvabben er en meget almindelig fisk i Danmark. Den lever på ret lavt vand langs kysterne og i fjorde. Den kan også trives i brakvand. Ålekvabben lever på havbunden, hvor den søger føde, når den glider rundt på sine brystfinner mellem ålegræs, alger og tang. Ålekvabber lever for det meste skjult.

Kendetegn

Ålekvabber er langstrakte fisk med lang, sammenvokset ryg-, hale- og gatfinne, små bugfinner og meget store brystfinner. Farven kan variere meget fra grønlig til mørkebrun eller gullig. Fisken har desuden mørkere pletter og tværbånd over ryggen og på siderne.

Føde

Ålekvabbens føde består af krebsdyr, orme, snegle og muslinger.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 50 cm
Vægt: Op til ca. 1 kg
Parring: August-september
Drægtighed: Ca. 4 måneder
Kuldstørrelse: 30-400 unger
Ungers længde: 35-55 mm
Levealder: ?
Kønsmodne efter 1-2 år

Vidste du det?

Ålekvabbernes formering er ganske speciel. Hannen leder sæden ind i hunnen via en lille hudtap, der sidder ved kønsåbningen. Eggene befrugtes og modnes inde i hunnen, der svømmer drægtig rundt i op til 4 måneder. Herefter føder hunnen op til 400 levende, små ålekvabber.



Ål


Latinsk navn: *Anguilla anguilla*

Engelsk navn: Eel

Klasse: Fisk

Orden: Ålefisk

Familie: Ål



Ålen er truet, men udbredt i hele Danmark, hvor den forekommer i søer, vandløb, floder, kyster og andre fjordområder. Ålen er også udsat i en del vandhuller og damme for at øge bestanden. Ålen trives bedst i lunt vand og holder sig oftest ved bredden eller kysten, nær bunden.

Kendetegn

Ålen er med sin slangeagtige krop nem at genkende. Derudover har ålen én lang finne på ryggen og meget små brystfinner. Oversiden er mørk, hvorimod farven på undersiden varierer fra gul til sølvblank alt efter alder og levested. Ålelarverne er glasklare og ca. 65 mm. lange.

Føde

Ål lever af krebsdyr, orme, snegle, muslinger, insekter og deres larver samt småfisk, frøer og ådsler. Ål jager om natten.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav

Længde (han): Op til ca. 30-50 cm

Længde (hun): Op til 120 cm

Vægt: Op til ca. 3,5 kg

Æg: ?

Gyder: ?

Max levealder: 25-50 år

Vidste du det?

Ål er vandrefisk, der yngler i Sargossohavet. Herfra flyder ålelarverne tilbage til kysterne og trækker som glasål op i vandløb. Her bliver de til gulål. Efter 6-15 år vandrer de voksne blankål (sølvblank bug) tilbage til havet for at yngle. Nogle når aldrig ud til havet for at gyde, og de forbliver gulål.