

Aborre


Latinsk navn: **Perca fluviatilis**

Engelsk navn: **European perch**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Aborre**



Aborren er en almindelig fisk i søer, åer, vandløb og moser. Den lever dog også i brakvand nær kysten. Aborren er en stimefisk, der ses hele året. Den opholder sig for det meste ved bunden, men jager også på åbent vand.

Kendetegn

Aborren kendes let på den høje ryg, de 4-7 sorte striber på siderne samt de orange-røde finner. Fisken er normalt sortgrøn på ryggen og lysere ned mod bugen. Aborren har pigge ved rygfinnerne og gællelågene. Skællene er grove.

Føde

Aborrers føde består af skaller, løjer og andre fisk, fiskeyngel, snegle, krebsdyr, insekter, larver og orme. Aborrrer sluger deres bytte helt.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Længde: 15-50 cm
Vægt: Normalt 100-500 g
(men kan veje helt op til 4 kg)
Æg: 4.000-300.000
Gyder: April
Levealder: 8-10 år, max 22 år

Vidste du det?

Aborren bliver kønsmoden alt efter mængden af føde i vandet. Under gode levevilkår sker det i løbet af 2-5 år, men er der kamp om føden, kan der gå seks år før fisken er kønsmoden. Størrelsen og vægten varierer også meget alt efter mængden af føde i vandet.

Elritse


Latinsk navn: **Phoxinus phoxinus**

Engelsk navn: **Common minnow**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Elritser er almindelige danske karpefisk. De lever i bække, åer og vandløb med klart og strømmende vand. Fiskene kan også trives i brakvand. Elritser færdes ofte i mindre stimer nær bunden mellem sten og vandplanter, hvor de søger efter føde. Om vinteren søger småstimerne ud på dybere vand.

Kendetegn

Elritsen er en slank fisk med en rund snude. Rygfinnen sidder langt tilbage på ryggen. Fisken har en mørkegrøn ryg samt blanke, grønne sider med mørkere markeringer. Bugen er lys eller gullig. I gydetiden bliver hannens bug og bugfinner dog røde, og hannen får vorter på hovedet.

Føde

Elritser lever af insekter, larver og krebsdyr, som de fanger mellem vandplanter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: Op til 12 cm

Vægt: ?

Æg: 200-1000

Gyder: Maj-juli

Max levealder: Ca. 10 år

Vidste du det?

Elritsen kan være en trussel for ørreden i visse vandløb, da elritsen og ørreden lever af de samme smådyr. Derudover kan elritser æde ørredrogn og true ørredbestanden.



Gedde

Latinsk navn: *Esox lucius*

Engelsk navn: Pike

Klasse: Fisk

Orden: Gedder

Familie: Gedder



Gedden er almindelig udbredt i hele Danmark. Den lever i ferskvandsøer og vandløb samt i brakvand og i havvand med et meget lavt saltindhold. Gedder foretrækker klart vand, da de jager med synet. Hannerne bliver kønsmodne som 2-3 årige, hunnerne som 3-5 årige.

Kendetegn

Gedden kan kendes på den meget aflange krop samt det store gab besat med spidse tænder. Geddens hovede er fladtrykt og bredt. Gedder er ofte sorte på ryggen, grønne på siderne med gule pletter og lyse på bugen. Geddens farve varierer efter omgivelserne. Rygfinnen sidder langt tilbage på ryggen.

Føde

Store, voksne gedder lever af andre større fisk, padder samt unger af vandfugle. Mindre gedder lever af fiskeyngel, insekter og plankton.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav

Længde: 40-150 cm

Vægt: 8-35 kg

Æg: Op til 250.000

Gyder: Marts-maj på lavt vand

Max levealder: 30 år

Vidste du det?

Gedden jager ved at stå ganske stille mellem planter og vente på, at et byttedyr kommer forbi. Af andre store fisk kan geddens bytte være brasener, aborrer, skaller og andre gedder. Geddens eneste fjende blandt andre fisk er dens artsfæller.

Brasen

Latinsk navn: **Abramis brama**

Engelsk navn: **Carp bream**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Brasener trives bedst i større søer, vandløb og åer med blød bund. Brasen kan også forekomme i brakvand langs kyster og fjorde. Brasener er stimefisk, der ofte lever nær bunden. I gydetiden trækker stimerne ind på lavt vand i ferske søer og vandløb. Om vinteren hviler de store stimer sig direkte på bunden på dybt vand, der ikke fryser til is.

Kendetegn

Brasen er en højrygget og fladtrykt karpefisk. Den er gylden eller bronzefarvet med et mørkegrønt skær på ryggen og hovedet. Finnerne er helt sorte. I gydetiden får hannen nogle gråhvide vorter på hovedet.

Føde

Brasen æder plankton samt forskellige bundlevende dyr. Ungerne æder plankton.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Op til 80 cm.
Vægt: Op til 9 kg.
Æg: 300.000
Gyder: Maj-juni
Max levealder: Ca. 20 år

Vidste du det?

Brasen kan lave sin mund om til et rør, som kan bruges til at suge mudder op med. Orme, larver, snegle, insekter og muslinger sorteres dernæst fra. Da brasener ikke har tænder i selve munden, knuses føden nede i svælget.

Grundling

Latinsk navn: *Gobio gobio*

Engelsk navn: **Gudgeon**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Grundlingen er mest udbredt på Sjælland og i Midt- og Østjylland. Fisken lever i langsomt strømmende og rene vandløb, i søer nær ved søbredden samt i brakvand. Grundlingen lever ofte i små stimer på meget lavt vand.

Kendetegn

Grundlingen har en lang og slank krop. Den er sølvfarvet, men noget mørkere på ryggen. På de blanke, sølvfarvede sider er der mørke skjolder samt en tydelig sidelinje. Man kan desuden kende grundlingen på de to skægtråde, der sidder i hver sin mundvig. I gydetiden får hannen vorter på hovedet.

Føde

Grundlinger lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver og små krebsdyr samt halvrådne plantedele.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: Ca. 12-20 cm

Vægt: Op til 200 g

Æg: 3000

Gyder: Maj-juni

Levealder: Ca. 6 år

Vidste du det?

Grundlingen gyder om sommeren på lavt vand mellem sten og planter. Efter ca. 15-30 dage klækkes æggene, og de nye fisk slutter sig til de ældre artsfæller, som lever nær bunden.

Havørred

Latinsk navn: **Salmo trutta**

Engelsk navn: **Sea trout**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Laks**

Familie: **Laks**



Havørreden er en udpræget vandrefisk. Det er den mest almindelige og udbredte form af ørreder i Danmark (se ørred). Havørreden vandrer ud i havet, hvor den lever, men den vender tilbage til ferske vandløb og åer i gydetiden.

Kendetegn

Havørreder er sølvblanke med mørk ryg, men når de foretager gydevandring ind i vandløb, bliver de meget mørkere. Desuden har havørreden sorte eller rødlige pletter på hele kroppen. Ørreder er generelt slanke, torpedofromede fisk med plump halefinne og en lille fedtfinne. Havørreden er normalt den største af de danske ørreder.

Føde

Havørreder lever af små krebsdyr, som rejer og tanglopper, samt forskellige småfisk.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Længde: Op til 140 cm
Vægt: Op til 18 kg
Æg: ?
Gyder: ?
Levealder: Normalt ca. 4-6 år, max 12-18 år

Vidste du det?

Ørreder er på grund af nogle specielle kirtler i stand til at regulere saltmængden i kroppen. Dette er grunden til, at nogle ørreder lever i ferskvand og andre i saltvand. Det er også denne særlige tilpasningsevne, der gør det muligt for havørreden at foretage gydevandring ind i vandløb.

Nipigget hundestejle


Latinsk navn: **Pungitius pungitius**

Engelsk navn: **Ninespine stickleback**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Hundestejle**

Familie: **Hundestejle**



Nipigget hundestejle er en almindelig fisk i Danmark. Den lever langs kyster samt i brakvand, søer, moser, grøfter og vandløb. Hundestejler gyder dog i ferskvand. Hannen forsvare sit territorium og reden i yngletiden.

Kendetegn

Den nipiggede hundestejle kan have 7-12 pigge på ryggen, men normalt har den 9 samt 2 pigge på bugen. Hundestejlen er slank og sølvskinnende med en brun eller grøn ryg samt sorte striber på siderne. Bugen er lys. I yngletiden bliver hannens bug og strube dog mørkere og brystfinnerne rødlige.

Føde

Den nipiggede hundestejler æder forskellige smådyr som dafnier, tanglopper, krebsdyr, vandinsekter og fiskeyngel.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Længde: Normalt 5-7 cm
Vægt: ?
Æg: 100-400
Gyder: April
Max levealder: 5 år

Vidste du det?

Hundestejler har ikke skæl ligesom mange andre fisk. I stedet har både den trepiggede hundestejle og den nipiggede hundestejle benplader, der delvist dækker kroppen.

Trepigget hundestejle


Latinsk navn: *Gasterosteus aculeatus*

Engelsk navn: Ninespine stickleback

Klasse: Fisk

Orden: Hundestejle

Familie: Hundestejle



Den trepiggede hundestejle findes i hele Danmark i alle typer af søer, vandhuller, vandløb og damme samt i brakvand og i havet langs kysten. Hundestejlerne er stimefisk, der ofte færdes i store antal langs bredden på lavt vand. I yngletiden er hannerne meget territoriale og beskytter deres yngel.

Kendetegn

Den trepiggede hundestejle har fået sit navn på grund af de tre pigge, den har på ryggen. Den bageste af piggene er meget lille. Derudover har fisken også en pig på bugen. Hundestejlen er grønlig med en sølvskinnende bug. Hannens bug bliver rød i yngletiden.

Føde

Hundestejler lever af forskellige smådyr som dafnier, vandinsekter, fiskerogn og krebsdyr.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Længde (i ferskvand): Op til 8 cm
Længde (i saltvand): Op til 11 cm
Vægt: 10-15 g
Æg: 100-400
Cyder: Marts-juni
Kønsmoden efter ca. 1 år
Max levealder: 3-4 år



Vidste du det?

Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvare aggressivt reden mod andre kønsmodne hanner. Æggene klækkes efter 4-27 dage.

Karpe


Latinsk navn: *Cyprinus carpio*

Engelsk navn: Common carp

Klasse: Fisk

Orden: Karpefisk

Familie: Karpefisk



Karpen lever vildt i danske søer, enten som udsatte fisk eller som undslupne fisk fra dambrug. De vildtlevende karper holder til i lunt vand og gerne hvor der er blød bund og mange vandplanter.

Kendetegn

Karper er kraftige fisk med en lang rygfinne og fire skægtråde. Der findes karper helt uden skæl og med mørkebrune og grønne farver, samt karper med få meget store skæl. Andre karper er gyldne med en mørk ryg, som er helt dækket af skæl.

Føde

Karper har ikke tænder, men de kan skyde munden ud som et rør og suge mud-der og smådyr ind i svælget, hvor føden filtreres fra. Karpen knuser sin føde med benplader i svælget.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til 20 kg

Æg: 500.000

Gyder: I varme somre

Max levealder: ?

Vidste du det?

Vilde karper kan ikke gyde og formere sig med mindre vandtemperaturen når op på ca. 17-20 grader. Det er ikke altid tilfældet om sommeren i danske søer. Om vinteren går karperne i dvale på søbunden.

Karusse

Latinsk navn: *Carassius carassius*

Engelsk navn: Common carp

Klasse: Fisk

Orden: Karpefisk

Familie: Karpefisk



Karussen er almindelig fisk i danske søer og damme. Den lever og trives fint i forurenede, tilgroede, sumpede og iltfattige vande. Om vinteren går karusserne i dvale enten på bunden eller nede i muddret. I Danmark findes der både damkarusser og søkarusser, hvilket skyldes fiskens tilpasning til levestedet.

Kendetegn

Karusser er dækket af skæl. De har mørke eller sortgrønne rygge, gyldne eller messinggrønne sider og en gullig bug. Søformen er desuden større end damformen.

Føde

Karusser finder sin føde på bunden. Føden består af forskellige plantedele og smådyr som insektlarver, krebsdyr, snegle, orme, muslinger og dyreplankton.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde (søform): Op til 50 cm
Længde (damform): Ca. 10-15 cm
Vægt (søform): Op til 2,5 kg
Vægt (damform): Ca. 200 g
Æg: 150.000-300.000
Gyder: Maj-juni
Max levealder: ?

Vidste du det?

Karussen kan, foruden sin farve og størrelse, også tilpasse sin kropsform til levestedet. Søkarusser, der lever i større søer, har en meget høj ryg, som gør den svær at sluge for fx en gedde. Damkarussen har ikke en nær så høj en ryg.

Laks


Latinsk navn: **Salmo salar**

Engelsk navn: **Salmon**

Klasse: Fisk

Orden: Laks

Familie: Laks



Laksen er almindeligt udbredt i Danmark, hvor den bl.a. forekommer naturligt i en del jyske åer og i Østersøen. Laksen er en vandrefisk, der vokser op i vandløb, åer og floder for senere i livet at vandre ud i havet. Efter flere år vender laksen tilbage til sit vandløb for at gyde.

Kendetegn

Laksen er en slank, torpedoformet fisk med smal halerod, kraftig halefinne og en lille fedtfinne bagest på ryggen. I havet har laksen en mørk ryg og er ellers sølvblank med spredte sorte pletter. I vandløbet, hvor laksene bliver gydemodne, er de mørkere og mere rødlige. Hannen udvikler en krog på underkæben.

Føde

Laks lever i havet af krebsdyr og forskellige fisk. De tager ikke føde til sig i ferskvand.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,

Kyst og hav

Længde: Op til 150 cm

Vægt: Ca. 20 kg, men op til 40 kg

Æg: Op til ca. 15.000

Gyder: September-januar

Max levealder: Ca. 10-15 år

Vidste du det?

Vandringerne fra havet ind i vandløb og floder kan være meget krævende for laksene. De foretager høje spring for at komme forbi vandfald og andre forhindringer. Da laksene ikke tager føde til sig på de lange vandringer, dør en del laks efter at have gydet.

Løje


Latinsk navn: *Alburnus alburnus*

Engelsk navn: **Bleak**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Løjen er en almindelig fisk i danske søer og rolige vandløb med svag strøm. Løjerne lever i store stimer nær overfladen. De foretrækker klart vand. Løjen gyder på lavt vand mellem sten og planter.

Kendetegn

Løjen er en lille, slank og sølvblank karpefisk. Den har en opadrettet mund med underbid samt store øjne. Løjens ryg er mørk med et grønligt skær, mens finnerne er farveløse eller grønne.

Føde

Løjer lever af smådyr, som de kan finde ved overfladen. Det kan bl.a. være vandinsekter, insektlarver, vandlopper og dafnier. Om vinteren lever løjerne på dybt vand med nedsat stofskifte og fødeoptagelse. Ynglen æder plankton.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Op til 15-20 cm
Vægt: ?
Æg: 1500
Gyder: Maj-juli
Max levealder: ca. 8 år

Vidste du det?

Løjen har mange fjender. Både i vandet i form af andre større fisk som fx aborrer, men også i form af fugle som måger og terner.

Ørred


Latinsk navn: **Salmo trutta**

Engelsk navn: **Brown trout**

Klasse: Fisk

Orden: Laks

Familie: Laks



Ørreden er almindeligt udbredt i danske åer, vandløb, bække, søer og i havet. Vandet skal være forholdsvis køligt og rent. I Danmark forekommer ørreden i tre underformer, som har forskellige levesteder. De gyder dog alle i bække eller vandløb med grusbund.

Kendetegn

Ørreder er slanke og torpedoformede laksefisk med en kraftig, plump hale. Derudover har ørreder en lille fedtfinne foran halefinnen. Fisken har spidse tænder. Ørredens farve varierer alt efter levested, og kan være sølvblank, bronzefarvet eller gul med sorte eller røde pletter. Ryggen er mørk.

Føde

Ørreder lever af plankton, insekter, krebsdyr, orme, fisk, padder og små pattedyr.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav

Længde: Op til ca. 100-140 cm,
bækørreder sjældent over 50 cm

Vægt: Op til 18 kg

Æg: ?

Gyder: ?

Max levealder: normalt ca. 4-6 år,
maks. 12-18 år

Vidste du det?

Søørreden lever ofte på dybt vand i søer, hvor den jager fiskestimer. Bækørreden lever i vandløb og små bække og trives bedst i læ for strøm mellem grene, sten og planter. Havørreden er en vandrefisk, der lever i havet og gyder i ferskvand (se havørred).

Regnbueørred

Latinsk navn: *Oncorhynchus mykiss*

Engelsk navn: Rainbow trout

Klasse: Fisk

Orden: Laks

Familie: Laks



Regnbueørreden findes i Danmark især som dambrugsfisk, men flere fisk har også spredt eller forvildet sig til vandløb, åer, søer og til havet. I naturen lever regnbueørrederne helst langs kysten i tang, på lavt vand eller i rolige vandløb med mange planter.

Kendetegn

Regnbueørreden er en slank, kraftig og torpedoformet fisk med et lille hoved. Fisker er skinnende med små, sorte pletter på krop og halefinne. Bugen er lys, hvorimod ryggen er mørkegrøn. På siderene har regnbueørreden desuden et rødviolet bånd.

Føde

Regnbueørreder lever af små krebsdyr som tanglopper og rejer samt småfisk, insekter og deres larver.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,

Kyst og hav

Længde: Op til 90 cm

Vægt: Op til 10 kg.

Æg: ?

Gyder: Efterår-vinter, men de kan dog ikke formere sig i Danmark.

Max levealder: ?

Vidste du det?

Naturligt vildtlevende regnbueørreder er vandrefisk, der lever og æder i havet, men gyder i ferskvand.

Rimte

Latinsk navn: *Leuciscus idus*

Engelsk navn: **Ide**

Klasse: Fisk

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Antallet af **rimter** i Danmark er gået tilbage de seneste år. De bestande af rimter, vi har, lever i vandløb med svag strøm og i søer med klart og rent vand. Rimten kan desuden overleve i brakvand og findes derfor i kyster og i store dele af Østersøen. Rimter lever i stimer og går i dvale om vinteren på dybt vand.

Kendetegn

Rimter er karpefisk med karakteristiske store, gule øjne. Derudover har de blanke sider med et grønt skær. Ryggen er ofte noget mørkere. Finnerne på undersiden af rimten er røde.

Føde

Rimten lever af småfisk, insekter, insektlarver, snegle, orme, fiskeyngel, små krebsdyr og muslinger. Rimter har ingen tænder, men knuser i stedet føden nede i svælget.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Længde: Op til 60-65 cm
Vægt: op til 3 kg
Æg: Op til 120.000
Gyder: Marts-maj
Max levealder: ?

Vidste du det?

Rimter er vandrefisk, der trækker op i vandløb for at gyde om foråret. Rimten kan ligesom laksen vandre over 100 km i strømvand og tilmed springe over forhindringer for at nå frem til gydepladserne. På gydepladserne svømmer rimterne rundt i overfladen, hvor de plasker og larmer.

Rudskalle

Latinsk navn: *Scardinius erythrophthalmus*

Engelsk navn: **Ide**

Klasse: Fisk

Orden: **Karpefisk**

Familie: **Karpefisk**



Rudskallen er udbredt i det meste af Danmark i åer, søer, damme og brakvandsfjorde. Rudskaller lever normalt i småstimer, også gerne sammen med andre karpefisk. De holder sig ved overfladen nær planter og bevoksning. Om vinteren trækker fiskene ud på dybere vand, hvor de opholder sig passivt på bunden.

Kendetegn

Rudskallen har en høj ryg og en sammentrykt krop. Siderne er lyse eller gyldne og dækket af store skæl. Finnerne er rødlig, ligesom øjnene. I gydetiden får hannen små hvide vorter på hovedet.

Føde

Rudskallens føde består af fiskerogn, blade fra vandplanter, alger, snegle, krebsdyr og insekter. Om vinteren spiser rudskallen ikke.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Ca. 20-45 cm
Vægt: Op til 3 kg
Æg: Op til 200.000
Gyder: Maj-juni
Max levealder: ?

Vidste du det?

Rudskaller gyder på lavt vand nær bredden. Æggene klæbes fast til vandplanter eller sten. Efter 3-10 dage klækker æggene. Ungerne fødes med blommesæk, som de lever af de første par dage. Herefter begynder de at søge føde.

Sandart

Latinsk navn: **Sander lucioperca**

Engelsk navn: **Zander**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Aborre**



Sandarten er oprindeligt ikke en naturlig vildtlevende fisk i Danmark, men den er blevet udsat. Sandarter lever helst i store, næringsrige søer samt i brakvand, fjorde, åer og ved kyster. Forekommer i store dele af Østersøen. Store sandarter opholder sig i frie vandmasser, hvor de bruger sanserne til at finde føde i det mørke og uklare vand. De mindre fisk holder ofte sammen i småstimer.

Kendetegn

Sandarter er lange, slanke fisk med store øjne og store gribetænder i undermund. Fisker er grønlig med mørk ryg og lys bug. Sandarten kan desuden kendes på piggene i rygfinnen.

Føde

Sandarten lever af forskellige småfisk som skaller, aborrer og løjer. Ynglen lever det første år af dyreplankton og andre smådyr.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Længde: Normalt 50-70 cm,
men op til 130 cm
Vægt: Ca. 2-20 kg
Æg: Ca. 500.000-750.000
Gyder: April-juni
Max levealder: 23 år

Vidste du det?

Sandarter gyder på ret lavt vand på sandbund, som fiskene laver fordybninger i, så æggene kan lægges der. Både hannen og hunnen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 1 uge. Sandarter kan af og til foretage længere gydevandring om foråret.

Snæbel

Latinsk navn: *Coregonus oxyrinchus*

Engelsk navn: European sprat

Klasse: Fisk

Orden: Laks

Familie: Laks



Snæblen er en meget sjælden fisk, der lever i Vadehavet og trækker op i de større jyske vandløb om efteråret for at gyde. Snæblen foretrækker vandløb med langsomt strømmende vand og vandplanter. Fiskene lever og jager normalt i stimer i de frie vandmasser.

Kendetegn

Snæblen kan især kendes på deres lange, spidse og mørke snude. Ellers er fisken sølvskinnende med store skæl og en sideline. Fiskens ryg er høj og munden er ret lille med overbid. Derudover har snæblen en lille fedtfinne bagest på kroppen.

Føde

Snæbler lever af dyreplankton og smådyr som insekter, insektlarver, snegle, muslinger og krebsdyr. Fisken filtrerer føden fra vandet med et gællegitter, der sidder i svælget.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 50 cm
Vægt: Op til ca. 4 kg
Æg: Op til 150.000
Gyder: November-december
Bliver kønsmoden efter 3-4 år
Max levealder: 10 år

Vidste du det?

Snæblen er en meget truet og sjælden fiskeart, der har sit sidste naturlige levested i Danmark. Den er totalfredet, og Danmark har et særligt ansvar for at sikre snæblens overlevelse og bevarelse. Snæblen er den eneste totalfredede fisk i Danmark.

Stalling


Latinsk navn: *Thymallus thymallus*

Engelsk navn: Grayling

Klasse: Fisk

Orden: Laks

Familie: Laks



Stallingen lever i en del jyske åer og vandløb med koldt og iltrigt vand. De foretrækker god strøm og dybe huller i bunden af vandløbet. Fiskene lever ofte i stimer ved bunden, hvor de søger efter føde. Stallingen kan dog også ses på lavt vand, eller på jagt efter føde i vandoverfladen.

Kendetegn

Stallingen er en metalgrå laksefisk med et rødt eller blåt skær. Ryggen er mørkere end siderne. Derudover er stallingen langstrakt med et spidst hoved, en lille mund og en høj, lang rygfinne. Mellem ryg- og halefinnen har stallingen en lille fedtfinne.

Føde

Stallinger lever af insekter og deres larver samt krebsdyr, orme, fiskeyngel og småfisk.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Normalt ikke over 45 cm, sjældent op til 70 cm.
Vægt: Normalt op til 1 kg, sjældent op til 3,5 kg.
Æg: Op til 8000
Cyder: Marts-maj
Max levealder: ?

Vidste du det?

Stalling kaldes på latin *Thymallus*, fordi en frisk-fanget stalling kan lugte af timian. Stallingen er fredet i Danmark frem til 2014, da den vildtlevende bestand er gået voldsomt tilbage de sidste år.

Suder


Latinsk navn: **Tinca tinca**

Engelsk navn: **Tench**

Klasse: Fisk

Orden: Karpefisk

Familie: Karpefisk



Suderen er almindelig udbredt i størstedelen af landet, hvor den lever i lune søer, moser, damme og rolige åløb med blød bund og mange vandplanter. Sudere lever nær bunden i småstimer. Om vinteren går suderen i dvale på bunden, hvor der er dybt vand. Den æder næsten intet i vintertiden.

Kendetegn

Sudere er brune eller mørkegrønne med et gyldent skær. De har meget små skæl, en høj ryg, røde øjne og to, små skægtråde. Suderen kan desuden kendes på den brede halerod, de runde finner samt dens ikke-kløftede hale.

Føde

Sudere lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver, orme, snegle, muslinger og halvrådne plantedele.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Op til 60 cm
Vægt: 1-5 kg
Æg: Op til 900.000
Gyder: Maj-juni
Max levealder: ?

Vidste du det?

Sudere finder føde på den bløde bund ved hjælp af sine meget følsomme små skægtråde. Når de leder efter føde, har de hele hovedet nede i muddret. Smådyr filtreres fra og knuses nede i svælget, da sudere ikke har tænder.



Ål


Latinsk navn: *Anguilla anguilla*

Engelsk navn: Eel

Klasse: Fisk

Orden: Ålefisk

Familie: Ål



Ålen er truet, men udbredt i hele Danmark, hvor den forekommer i søer, vandløb, floder, kyster og andre fjordområder. Ålen er også udsat i en del vandhuller og damme for at øge bestanden. Ålen trives bedst i lunt vand og holder sig oftest ved bredden eller kysten, nær bunden.

Kendetegn

Ålen er med sin slangeagtige krop nem at genkende. Derudover har ålen én lang finne på ryggen og meget små brystfinner. Oversiden er mørk, hvorimod farven på undersiden varierer fra gul til sølvblank alt efter alder og levested. Ålelarverne er glasklare og ca. 65 mm. lange.

Føde

Ål lever af krebsdyr, orme, snegle, muslinger, insekter og deres larver samt småfisk, frøer og ådsler. Ål jager om natten.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav

Længde (han): Op til ca. 30-50 cm

Længde (hun): Op til 120 cm

Vægt: Op til ca. 3,5 kg

Æg: ?

Gyder: ?

Max levealder: 25-50 år

Vidste du det?

Ål er vandrefisk, der yngler i Sargossohavet. Herfra flyder ålelarverne tilbage til kysterne og trækker som glasål op i vandløb. Her bliver de til gulål. Efter 6-15 år vandrer de voksne blankål (sølvblank bug) tilbage til havet for at yngle. Nogle når aldrig ud til havet for at gyde, og de forbliver gulål.