

Bananflue


Latinsk navn: *Drosophila funebris*

Engelsk navn: Fruit Fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Bananfluer



Bananfluen er en meget lille flue, som er meget almindelig overalt i Danmark, både i naturen og indendørs. Bananfluen findes først og fremmest i løvskove.

Kendetegn

Bananfluer kendes især på deres rustbrune krop og de store, røde øjne. Vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkroppen.

Føde

Bananfluer lever på alle former for frugt og grønt, som gærer. De tiltrækkes også af fx marmelade, saftvand, øl og vin. Hvis man har et glas saft til at stå natten over, kan man ofte se bananfluer i glasset næste morgen.

Fakta

Levesteder: Skoven
Størrelse: 3-4 mm
Klækning æg: 1 døgn
Larvetid: Ca. 4 døgn
Puppetid: Ca. 4 døgn
Kønsmoden efter ca.
1 døgn uden for puppen.

Vidste du det?

Bananfluer formerer sig utroligt hurtigt, og derfor er de velegnede som forsøgsdyr, hvis man fx vil undersøge arvelighed. Bananfluerne bruges også som foder til mange forskellige slags dyr, fx terrariedyr og akvariefisk, fordi de er lette at holde og få til at formere sig.

Dansemyg



Latinsk navn: *Chironomus plumosus*

Engelsk navn: Buzzer Midge

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Dansemyg



Der findes over 400 forskellige arter af dansemyg i Danmark. Fælles for dem er, at de ikke stikker. Dansemyggene lever både inde i landet, ved vådområder og nær kysten. Larverne lever på bunden af vandhuller, søer, brakvand og vandløb.

Kendetegn

Dansemyg har en lang krop og to forholdsvis korte vinger. Benene er fine og lange. Hannen har fjerlignende antenner, mens hunnen har tynde antenner. Dansemyg kan være grå, gule, sorte eller grønne. Larverne er ormelignende og kan være både røde, glasklare og grønne.

Føde

Voksne dansemyg tager ikke føde til sig. De lever kun ganske få dage. Larverne æder alger, plantedele, bakterier, krebsdyr samt andre myggelarver.

Fakta

Levesteder:
Sø og vandløb
Længde: 3-10 mm
Vingefang: 15 mm
Parring: Forår-forsommer
Antal æg: ?
Puppetid: Ca. 4-8 uger
Længde: 30 mm.

Vidste du det?

Om foråret og om forsommeren kan man se store sværme af dansemyg, hvor parringen finder sted. Æggene klækkes hurtigt, og larverne søger ned på bunden af søen eller vandløbet. Larverne forpupper sig næste forår, og de er efter en månedstid klar til at bryde ud af pupperne og slutte sig til de store sværme.

Dobbeltbåndet svirreflue


Latinsk navn: *Episyrphus balteatus*

Engelsk navn: Marmalade Hoverfly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Svirrefluer



Dobbeltbåndet svirreflue er almindelig og udbredt overalt i landet. Svirrefluen findes på mange forskellige levesteder og ses meget tit i haver. Hunner af dobbeltbåndet svirreflue kommer til Danmark, når det bliver forår, og lægger æg. I varme somre kan der være milliarder af dobbeltbandede svirrefluer herhjemme.

Kendetegn

Dobbeltbåndet svirreflue har store, runde øjne, korte antener og to klare vinger. Bagkroppen er orangebrun med sorte tværbånd. Dobbelte bånd på 3. og 4. bagkropsled er karakteristisk for arten.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Længde: 7-12 mm

Vingefang: 20 mm

Larvelængde: 10-12 mm

Larvetid: 7-10 dage

Puppetid: 10-15 dage

Kan ses: April-oktober

Føde

Dobbeltbåndet svirreflue lever af pollen og nektar fra blomster. Larverne er rovdyr og æder bladlus.

Vidste du det?

Dobbeltbåndet svirreflue ligner til forveksling bier, hvepse eller gedehamse med de orange og sorte advarselsfarver på bagkroppen. Men svirrefluer kan ikke stikke og er helt ufarlige.

Dyndflue


Latinsk navn: *Eristalis tenax*

Engelsk navn: Drone fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Svirrefluer



Dyndfluen er en stor svirreflue, som på grund af sine farver nemt forveksles med en han-bi, dvs. en drone, og derfor kaldes den også droneflue. Den lever især ved små vandhuller og træffes ofte i skovlysninger.

Kendetegn

Dyndfluen kendes især på sin sorte og gule bagkrop, men ser man godt efter, vil man opdage, at den har to bånd af mørke hår tværs over øjnene.

Føde

Dyndfluen lever mest af pollen og nektar fra blomster. Dyndfluens larve lever i dynd, dvs. forurenede vandhuller, hvor den spiser bakterier og rådne planter. Vi kalder dyndfluens larve for rottehale, og den er et eksempel på et dyr, der kan leve i meget forurenede og iltfattigt vand.

Fakta

Levesteder: Skoven

Størrelse: 14-16 mm

Æg: Lægges i lavt vand eller mudder

Larve: Hvidlig med langt ånderør

Længde larve: Ca. 2 cm

Ånderør: Ca. 4 cm

Vidste du det?

Dyndfluens larve, "rottehalen" viser tydeligt, hvis et vandhul er forurenet. Den trives kun hvor der er mudder, slam og rådne plantedele. Den ånder ved at stikke sit lange ånderør op gennem mudderen eller vandet. Ånderøret er dobbelt så langt som selve larven.



Guldklæg

Latinsk navn: *Chrysops Relictus*

Engelsk navn: Deer-fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Klæger



Guldklægen er en halvstor flue med meget flotte farver. Den er meget almindelig i Danmark og træffes især ved fugtige områder som vandhuller, søer og moser.

Kendetegn

Guldklægen kendes især på sine flotte rødlige eller grønne øjne med violette pletter. Bagkroppen er gulbrun med sorte trekantede pletter. Vingerne er gennemsigtige med brune aftegninger.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Sø og vandløb
Størrelse: 6-10 mm

Føde

Hannen lever af nektar og plantesaft, men hunnen suger blod, både hos dyr og mennesker. Det er meget smertefuldt, hvis guldklægen får held til at bore sin kraftige sugesnabel ind gennem huden. Guldklægens larve lever i fugtigt sand eller mudder, hvor den æder halv rådne plantedele.

Vidste du det?

Guldklægen kan stikke ligesom en myg, men dens bid og stik er meget mere smertefuldt. Selv om man vifter en guldklæg bort, forsøger den igen og igen at sætte sig på huden for at suge blod.

Kvægmyg


Latinsk navn: **Simuliidae**

Engelsk navn: **Black fly**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Tovinger**

Familie: **Kvægmyg**



Kvægmyg er almindelige overalt i Danmark. Larverne lever i åer og bække - gerne i vandløb, der er forurenet af dødt, organisk materiale. Man kan især i varmt og fugtigt vejr se tætte sværme af voksne kvægmyg omkring heste og kvæg.

Kendetegn

Kvægmyg ligner til forveksling små fluer. Bagkroppen er mørk, brystet er sort, skinnede og hvælvet. Myggen er gråhvid på undersiden. De to brede vinger er taglagte, når den er i hvile. Følehornene er ret tykke og korte.

Føde

Hunnen suger ved hjælp af sin kraftige sugesnabel blod fra kvæg, heste og mennesker. Larven lever af bakterier og andre organismer, som den filtrerer fra vandet ved brug af to vifter med fjerlignende børster.

Fakta

Levesteder:

Sø og vandløb

Længde: 1,3-4 mm

Vingefang: ? mm

Parring: ?

Puppetid: ? uger

Larvelængde:

op til 10 mm

Vidste du det?

Kvægmyggens larve er fastgjort til sten eller planter nede i vandet med et spind af tråde. Inden larven forpupper sig, spinder den et hylster, som fastgøres til under laget. Fra enden af hylsteret stritter nogle grålige gælletråde ud. Kvægmyggens puppe ligner et lille kræmmerhus.

Regnklæg


Latinsk navn: *Haematopota pluvialis*

Engelsk navn: Horse Fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Klæger



Regnklæg er meget almindelig overalt i Danmark, men den findes især på åbne arealer med kvæg eller i skovområder, hvor der er hjorte. Regnklægerne kommer især frem, når det er varmt og fugtigt.

Kendetegn

Regnklæg er en mellemstor flue. Kroppen er grå, og vingerne er klare med grå og lysebrune aftegninger. Når klægen sidder stille, samler den vingerne vandret hen langs ryggen.

Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
Størrelse: 8-13 mm
Parring: juni-august
Livscyklus: 1 år

Føde

Hannerne lever af nektar, men hunnerne suger blod fra store pattedyr og mennesker. Larverne lever i dynd eller mudder, hvor de æder orme, larver og insekter.

Vidste du det?

Regnklægene kan være irriterende insekter, fordi de bider hul på huden for at suge blod. Det er dog kun hunnerne, der lever af blod. Selv om man vifter en regnklæg bort, vil den forsøge igen og igen at bide hul på huden.

Skovmyg


Latinsk navn: *Aedes communis*

Engelsk navn: Mosquito

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Stikmyg



Skovmyggen er meget almindelige i skove og krat, hvor de yngler i små vandhuller, vandpytter og grøfter.

Kendetegn

Skovmyggene kendes især på deres summelyd. Hunnen har en lang stiksnabel. Hannen har fjerformede antenner. Skovmyggens larver findes om foråret i de fleste småsøer og vandhuller, hvor de "hænger" med deres ånderør stukket op gennem vandoverfladen.

Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
Størrelse: Ca. 7 mm
Parring: Maj-august
Æg: Overvintrer i udtørrede vandpytter
Larvetid: 5-8 uger
Puppetid: 3-4 dage

Føde

Skovmyggene lever af nektar fra blomsterplanter. Men hunnen har brug for blod fra pattedyr eller mennesker, hvis æggene skal udvikles bedst muligt. Derfor er det kun hunnen, der stikker og suger blod. Den kan til gengæld stikke og suge et blodmåltid til sig op til 20 gange i sin levetid.

Vidste du det?

Når hunmyggen stikker, sprøjter den en væske ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Det er denne væske, som giver kløende myggestik. Hvis man lader myggen suge blod i fred, vil den suge det meste af væsken op sammen med blodet.

Spyflue


Latinsk navn: *Calliphora vomitoria*

Engelsk navn: **Blue bottle fly**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Tovinger**

Familie: **Spyfluer**



Den almindelige eller blå **spyflue** er meget almindelig og udbredt overalt i Danmark. Den lever både i det åbne land og skoven samt i byen. Spyfluer lægger æg eller "spy" i dødt kød, ekskrementer og ådsler, som de finder ved hjælp af deres fremragende lugtesans. Spyfluen kan ses hele året, men flyvetiden er maj-oktober.

Kendetegn

Almindelig spyflue er en bred flue med sort bryst og rygskjold samt en håret, blålig bagkrop. Fluen har to gennemsigtige vinger og store rødlige øjne. Larverne er blinde, hvidlige maddiker, der er spidse i den ene ende.

Føde

Spyfluelarverne lever af dødt kød, ådsler og ekskrementer.

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land
Længde: 9-12 mm
Vingefang: ? mm
Parring: ?
Æggene klækkes i løbet af 1 døgn
Larvelængde: 10-15 mm
Larvetid: ca. 1 uge
Puppetid: ?

Vidste du det?

Hvis spyfluer kommer i kontakt med madvarer, som fx et stykke kød, lægger de ofte æg, som inden et døgn udvikler sig til maddiker. Spyfluerne kan ved deres kontakt med maden overføre sygdomsfremkaldende bakterier. Mad, der har været i kontakt med spyfluer, bør derfor ikke spises.

Stor humleflue


Latinsk navn: *Bombylius major*

Engelsk navn: Greater Bee Fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Humlefluer



Stor humleflue er meget almindelig at se om foråret i skove og skovbryn samt langs hegn, i haver og parker. Den er meget almindelig, men fordi den er tidligt fremme om foråret, lægger man ikke så meget mærke til den.

Kendetegn

Stor humleflue har en kort og bred krop, der er tæt dækket af gulbrune hår. Den ligner en humlebi, og det har givet den navnet. Stor humleflue kendes især på sin meget lange sugesnabel, der kan udgøre mere en halvdelen af kropslængden.

Fakta

Levesteder:

Skoven, Det åbne land

Størrelse: 7-12 mm

Formering: Æg

Flyvetid: April-maj

Føde

Stor humleflue lever af nektar fra blomster. Humlefluens larve er en snylter, som lever af larverne fra jordbier.

Vidste du det?

Stor humleflue er en meget dygtig flyver, som kan stå helt stille i luften, når den suger nektar i blomsterne med sin lange snabel. Dens bevægelser minder lidt om en kolibris. Stor humleflue udsender en høj summen, men den er ganske ufarlig og kan ikke stikke.

Tidselfbåndflue


Latinsk navn: *Urophora cardui*

Engelsk navn: Canada Thistle Steam Gall Fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Båndfluer



Tidselfbåndfluen er meget almindelig på steder, hvor der er mange tidsler, især langs markkanter, langs veje og i skovbryn. Hvis solen skinner, og det er varmt, kan man ofte se tidselfbåndfluerne på planterne.

Kendetegn

Tidselfbåndfluen er en ret stor båndflue. Den kendes på de flotte bånd på vingerne, den gule plet bagest på forkroppen, og den blåsorte bagkrop, som hos hunnen ender i en kort læggebrod.

Fakta

Levesteder:
Skoven
Størrelse: 5-6 mm
Flyvetid: Maj-juli
Formering: Æg
Larven lever i en galle

Føde

Tidselfbåndfluen lever sandsynligvis af plantesaft, men mange mener, at de voksne fluer slet ikke tager føde til sig. Dens larve lever i ager-tidsler, hvor den bor inde i en galle og suger saft fra tidslen.

Vidste du det?

Tidselfbåndfluerne findes på steder, hvor der vokser mange tidsler. Selv om flyvetiden er kort, kan man finde spor hele året efter tidselfluerne på tidslerne. Hvor larverne har boret sig ind i et blad, er der dannet en hård galle. Inde i gallen lever larven af saft fra planten - godt beskyttet.



Vintermyg


Latinsk navn: *Trichocera Hiemalis*

Engelsk navn: Winter Crane Fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Vintermyg



Vintermyg er almindelige i hele Danmark. De træffes især i skove, haver og krat. Modsat de fleste andre insekter er vintermyg fremme i vinterhalvåret, og man kan ofte se dem sværme lavt over jorden, blot der er en smule læ og sol.

Kendetegn

Vintermyggene er lidt større end stikmyg, og benene er meget lange og tynde, så de minder om små stankelben. Vingerne er klare.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Længde: 8-10 mm.
Flyvetid: Oktober-
marts

Føde

Vintermyg suger ikke blod, og de lever hele deres liv som voksne uden at tage føde til sig. Larverne lever i rådne plante dele, hvor de spiser dem.

Vidste du det?

Hvis man ser mange myg, der sværmer sent på efteråret eller om vinteren, er det vintermyg. Det er især hannerne, der sværmer for at tiltrække hunner. Hvis en hun nærmer sig sværmen, vil en eller flere hanner bryde ud fra sværmen og forsøge at parre sig med hende.