

Agerhøne

Latinsk navn: *Perdix perdix*
Engelsk navn: Grey Partridge
Klasse: Fugle
Orden: Hønefugle
Familie: Fasanfugle



Agerhønen er en almindelig standfugl i Danmark. Agerhøns lever i det åbne land på agerjord og marker med læhegn, heder, moser overdrev og enge. Reden er en fordybning i jorden, der er godt skjult i vegetation. Om vinteren lever agerhøns i familieflokke.

Kendetegn

Agerhønen er en lille rund og buttet hønefugl med kort rødbrun hale. Næbbet er kraftigt og kort. Agerhønen er grålig med brunlige og rødbrune tværstriber, orangebrunt ansigt og en mørkebrun bugplet. Hunnens bugplet er mindre end hannens. Agerhøns flyver lavt over jorden med hurtige vingeslag.

Føde

Agerhøns lever af frø, spirer, korn, græs, ukrudt, edderkopper og insekter.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 45-48 cm
Længde: 28-32 cm
Vægt: 350-450 g
Maks. levealder: 5 år
Kuldstørrelse: 10-20 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 90-100 dage

Vidste du det?

Intensivt landbrug og brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt har ført til en stor tilbagegang i bestanden af agerhøns. Især mange kyllinger dør som følge af mangel på insekter. Hvert år udsættes der dog mere end 50.000 agerhøns til jagt i Danmark.

Fasan

Latinsk navn: **Perdix perdix**
Engelsk navn: **Grey Partridge**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Hønefugle**
Familie: **Fasanfugle**



Fasaner lever året rundt inden for et lille område, hvor de finder føde og formerer sig. Uden for yngletiden træffes fasanerne ofte i mindre flokke – hunner og hanner hver for sig. I yngletiden danner hannerne territorier, som de forsvare over for andre hanner.

Kendetegn

Fasanhannen er særlig kendt for sin flotte fjerdragt i brune og grønne nuancer og det røde parti omkring øjnene samt den lange spidse hale. Hunnen er mindre end hannen og ikke så farvestrålende.

Føde

Fasanernes kost er meget alsidig. De lever af, hvad de kan finde på jorden og lige under jordoverfladen. De spiser bær, frø, løg og rødder samt insekter og snegle.

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 70-90 cm
Længde(han): 89 cm
Vægt: 1,05 - 1,4 kg
Max levealder: 8-15 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 23-28 dage
Ungetid: 70-80 dage

Vidste du det?

Fasanen er ikke en oprindelig dansk fugl. Den blev indført fra Asien som jagtfugl og ynglede første gang i Danmark i midten af 1800-tallet. Nu er fasanen den mest betydningsfulde jagtfugl i Danmark.



Vagtel

Latinsk navn: *Coturnix coturnix*

Engelsk navn: **Quail**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Hønefugle**

Familie: **Fasanfugle**

Vagtlen yngler på enge, korn-, kløver- og græsmarker i Danmark. Den lever skjult i vegetationen, og man ser den sjældent. Trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj og trækker til Afrika og Middelhavsområdet i september-oktober for at overvintre.

Kendetegn

Vagtlen er en lille hønefugl. Den har gråbrun overside med mørke og lyse striber og hvid underside. Hannen har hvid øjenbrynsstribe, sort midterstribe på struben og et kraftigt, tredelt kald, der kan høres om natten eller i skumringen. Hunnen har lys strube uden midterstribe.

Føde

Vagtler æder frø, insekter og larver, som de finder på jorden og i græsset ved at skrabe med næb og fødder.



Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 32-35 cm
Længde: 17-18 cm
Vægt (han): 70-100 g
Vægt (hun): 85-135 g
Kuldstørrelse: 7-13 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 17-20 dage
Ungetid: 30-50 dage

Vidste du det?

Antallet af vagtler i Danmark varierer meget fra år til år. Normalt er vagtlen ret sjælden, men i varme somre med "vagtelår" kan der yngle flere hundrede i landet. Ofte har fuglene allerede fået et kuld unger i Middelhavsområdet, før de kommer hertil.



Engsnarre


Latinsk navn: *Crex crex*

Engelsk navn: Corncrake, Landrail

Klasse: Fugle

Orden: Tranefugle

Familie: Vandhøns



Engsnarren ankommer til Danmark på træk i april/maj og trækker bort igen til august/september for at overvintrere i Afrika. Arten lever i det åbne land på dyrkede marker, græsmarker og græsenge med tæt græsvegetation. Engsnarren er en sjælden ynglefugl her i landet.

Kendetegn

På oversiden er engsnarren rødbrun med sorte dråbeformede aftegninger. Halssider, bryst og strube er gråbeige, og bug, flanker og gump er rustrøde med hvide tværstriber. Næbbet er kort, kraftigt og svagt rødligt.

Føde

Engsnarrens føde består af insekter, snegle, regnorme, andre smådyr og græsfrø, som den finder i den tætte vegetation.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 46-53 cm
Længde: 23-27 cm
Vægt: 135-200 g
Maks. levealder: 3 år
Kuldstørrelse: 8-12 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 16-19 dage
Ungetid: 60 dage

Vidste du det?

Engsnarren lever godt skjult i vegetationen, og man ser den meget sjældent. Dog kan man være heldig at høre hannens tørre og hæse parringskald "crex crex" om natten. Hannens kald har givet arten sit latinske navn.



Grønbenet rørhøne

Latinsk navn: *Gallinula chloropus*

Engelsk navn: Common moorhen

Klasse: Fugle

Orden: Traner

Familie: Vandhøns

Grønbenede rørhøns er almindelige ynglefugle i hele Danmark. De holder især til ved søer, moser og damme, men træffes også i parker samt ved rørskove. De grønbenede rørhøns bygger reder af vandplanter. Størstedelen af de danske rørhøns er trækfugle.

Kendetegn

Den grønbenede rørhøne er sort med brune vinger og lyse sidestriber. Den har grønne tæer og hvide underhalefjer. Særligt karakteristisk er desuden den røde blis i panden.

Føde

Rørhønernes føde består af smådyr som insekter, orme, snegle og larver samt frø og frugter. De finder føden i vandoverfladen eller i rørskoven.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 50-55 cm
Længde: 35 cm
Vægt: 250-420 g
Max levealder: 18 år
Kuldstørrelse: 5-9 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 19-22 dage
Ungetid: 40-50 dage

Vidste du det?

Når den grønbenede rørhøne svømmer eller går oppe på land, vipper den konstant med halen, hvorved de hvide underhalefjer rykvis kommer til syne.



Blishøne

Latinsk navn: **Fulica atra**

Engelsk navn: **Eurasian coot**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Traner**

Familie: **Vandhøns**



Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes nær søer og moser med en rig plantevækst. Blishønen er både en træk- og standfugl. Den kan ses hele året – også som vintergæst nordfra.

Kendetegn

Blishønen er en tæt bygget og tung vandhøne. Den har en sort/koksgrå fjerdragt bortset fra det hvide næb og den hvide pandeblis. Blishønen har desuden kraftige fødder og lange tæer.

Føde

Blishønsene finder både føde på land og nær rørskov. De kan dykke ned til et par meters dybde. Føden består især af vandplanter, skud af tagrør, småfisk, haletudser samt insekter og snegle.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 70-80 cm
Længde: 38 cm
Vægt (han): 750-900 g
Vægt (hun): 500-800 g
Maks. levealder: 20 år
Kuldstørrelse: 6-10 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 55-60 dage

Vidste du det?

Om foråret kæmper blishønsene om yngleterritorierne. Det foregår under støj, vingebasken og plasken, når de pisker efter hinanden i vandoverfladen. Blishønsene truer hinanden ved at sænke hovedet og løfte vingerne højt.

Urfugl

Latinsk navn: **Tetrao tetrix**

Engelsk navn: Black Grouse

Klasse: **Fugle**

Orden: **Hønefugle**

Familie: **Skovhøns**



Urfuglen blev erklæret uddød i Danmark i 2001. Tidligere levede fuglen på åbne lyngheder, hedemoser, overdrev og enge med krat få steder i Vestjylland. Urfuglen yngler i resten af Skandinavien, Rusland, Mellemeuropa og Asien. Urfugle er standfugle, der bliver i yngleområdet i hele året.

Kendetegn

Urfuglhannen eller kokken har blåsort, metalskinnende fjerdragt, en lang, lyreformet hale, hvid undergump og rød kam over øjnene. Hønen er buttet, gulbrun og spraglet med sorte og grå pletter. Hønen er mindre end kokken.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 65-80 cm
Længde (han): 53 cm
Længde (hun): 41 cm
Vægt (han): 1000-1400 g
Vægt (hun): 750-1100 g
Maks. levealder: 12 år
Kuldstørrelse: 6-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-27 dage
Ungetid: 40-50 dage

Føde

Urfuglen lever af friske skud og knopper, bær, frø, urter, rødder, grønne blade og andre plantedele. Kyllingerne æder kun insekter.

Vidste du det?

I foråret samles kokkene i flokke på bestemte spillepladser, hvor de tidligt om morgenen opfører et parringsspil for at tiltrække høner. Kokkene løber rundt med udspilede hale og strakte halse, mens de slår med vingerne og hakker ud efter hinanden med næbbet under høje lyde.



Trane

Latinsk navn: *Grus grus*

Engelsk navn: **Common crane**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Tranefugle**

Familie: **Traner**

Tranen er en trækfugl, der passerer Danmark i marts og igen i september. Kun få traner yngler i Danmark, hvilket sker ved uforstyrrede moseområder. Tranen lever generelt ved skjulte vådområder med spredt vegetation.

Kendetegn

Tranens fjerdragt er grålig. Den lange hals er sort foran med et hvidt bånd bagpå hele vejen op til øjet. Tranen har desuden en rød isse. Vingerne er grå som resten af fjerdragten, dog med sorte svingfjer. Tranen flyver med strakt hals og ben. Under trækket flyver tranerne ofte i V-formation.

Føde

Traner lever hovedsageligt planteføde såsom bær, korn og frø. De tager dog i mindre grad også insekter og andre smådyr.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 180-230 cm
Længde: 100-120 cm
Vægt: 4-7 kg
Maks. levealder: 17 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Vidste du det?

Tranen er særlig kendt for sin dans. Dansen består i, at to eller flere traner hopper og springer rundt med udbredte og let hængende vinger for så at bukke dybt for hinanden. Tranernes dans har en vigtig social betydning.