

Almindelig rygsvømmer


Latinsk navn: *Notonecta glauca*

Engelsk navn: Common Backswimmer

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Rygsvømmere



Almindelig rygsvømmer findes i hele Danmark. Den er nem at få øje på, fordi den opholder sig det meste af tiden ved vandoverfladen.

Kendetegn

Almindelig rygsvømmer er lys brun på oversiden og mørkebrun på undersiden. Kroppen er tilpasset livet i vandoverfladen. Den er næsten bådformet, og bagbenene fungerer næsten ligesom årer på en båd.

Føde

Almindelig rygsvømmer er et grådigt rovdyr. Den ligger på ryggen med benene i vandhinden, og når der kommer et andet dyr forbi, kaster den sig efter det, selv dyr, der er meget større end den selv.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Størrelse: Op til ca. 18 mm
Vingefang: 20-25 mm
Klækketid æg: 2 uger
Nymfetid: 1 måned
Flyvetid: Hele året, når der er isfrit.

Vidste du det?

Rygsvømmeren henter ilt i vandoverfladen, og den kan derfor træffes i brakvand og let forurenet vand. Rygsvømmeren er en dygtig flyver, og man kan tydeligt høre dens brummende lyd, når den flyver. Rygsvømmeren overvintrer på bunden af søen eller vandhullet.

Almindelig skøjteløber


Latinsk navn: *Gerris lacustris*

Engelsk navn: Back swimmer

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Skøjteløbere



Almindelig skøjteløber er den mest udbredte skøjteløber i Danmark. Den er en vandtæge, som lever i overfladen af mindre søer, vandløb, vandhuller og moser. Skøjteløberen "skøjter" på vandoverfladen. Kun når hunnen fastgør æg til vandplanter, bevæger den sig ned under vandoverfladen. Skøjteløberen overvintrer på land fra november til marts.

Kendetegn

Den almindelige skøjteløber har forrest på sin sortbrune krop to korte gribe-ben. Længere tilbage har den fire lange og meget tynde ben, som danner et X. Nymferne er mindre end de voksne, de er lysere og mere flade.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 17-18 mm
Vingefang: 35 mm
Parring: Sidst på foråret

Føde

Almindelig skøjteløber fanger andre insekter som myg og fluer i vandoverfladen. Den spiser også druknede insekter.

Vidste du det?

De to bageste benpar og kroppen er dækket med et tyndt lag vandskyende hår, som gør, at skøjteløberen hverken drukner eller bliver våd, når den bevæger sig hen over vandoverfladen.

Almindelig søvårflue


Latinsk navn: *Limnephilus rhombicus*

Engelsk navn: Common Caddis Fly

Klasse: Insekter

Orden: Vårfluer

Familie: Limnephilidae



Almindelig søvårflue er udbredt i hele Danmark. Den lever ved vandhuller, søer og åer med mange vandplanter. Vårfluen ses i naturen maj-oktober. Den er mest aktiv om aftenen og om natten. Hunnen fastgør sine æg til vandplanter eller lægger dem i klumper på vandet. Efter ca. 2 uger kommer larverne frem.

Kendetegn

Den almindelige søvårflue er oftest gulbrun eller rødbrun. Forvingerne er smalle og har mørke aftegninger samt en karakteristisk lys plet. Bagvingerne er brede og lyse. Vingerne er behårede. Søvårfluens antenner er omtrent lige så lange som kroppen.

Føde

De voksne vårfluer tager sjældent føde til sig. De kan dog suge dug eller nektar op med sugesnablen. Larverne æder forskellige vandplanter og alger.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Op til 25 mm
Vingefang: Op til 36 mm
Parring: Maj-juni
Puppetid: ca. 2 uger

Larve

Længde: Ca. 2,5 cm

Vidste du det?

Søvårfluelarven lever på bunden og kan ses året rundt i vådområder. Larven bygger sig et hus af forskellige materialer som snegle, skaller, sten, sandkorn og plantedele. Der er stor forskel på, hvordan larvernes huse ser ud. Nogle vårfluelarver lever også frit i vandet.

Dansemyg



Latinsk navn: *Chironomus plumosus*

Engelsk navn: Buzzer Midge

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Dansemyg



Der findes over 400 forskellige arter af dansemyg i Danmark. Fælles for dem er, at de ikke stikker. Dansemyggene lever både inde i landet, ved vådområder og nær kysten. Larverne lever på bunden af vandhuller, søer, brakvand og vandløb.

Kendetegn

Dansemyg har en lang krop og to forholdsvis korte vinger. Benene er fine og lange. Hannen har fjerlignende antenner, mens hunnen har tynde antenner. Dansemyg kan være grå, gule, sorte eller grønne. Larverne er ormelignende og kan være både røde, glasklare og grønne.

Føde

Voksne dansemyg tager ikke føde til sig. De lever kun ganske få dage. Larverne æder alger, plantedele, bakterier, krebsdyr samt andre myggelarver.

Fakta

Levesteder:
Sø og vandløb
Længde: 3-10 mm
Vingefang: 15 mm
Parring: Forår-forsommer
Antal æg: ?
Puppetid: Ca. 4-8 uger
Længde: 30 mm.

Vidste du det?

Om foråret og om forsommeren kan man se store sværme af dansemyg, hvor parringen finder sted. Æggene klækkes hurtigt, og larverne søger ned på bunden af søen eller vandløbet. Larverne forpupper sig næste forår, og de er efter en månedstid klar til at bryde ud af pupperne og slutte sig til de store sværme.

Almindelig dovenflue


Latinsk navn: *Sialis lutaria*

Engelsk navn: Alderfly

Klasse: Insekter

Orden: Dovenfluere

Familie: Sialidae



Den voksne dovenflue ses ofte langs bredderne af søer og vandløb om foråret. Dovenfluens larve er et rovdyr, som kan leve i mudret og let forurenset vand. Dovenfluen er udbredt og almindelig i hele Danmark.

Kendetegn

Den almindelige dovenflue er meget mørkebrun eller næsten sort. Vingerne har tydelige ribber, som gør nemt at kende dovenfluene fra vårfluer. Larven kendes på sit halevedhæng samt de mange vedhæng til gællerne på bagkroppen.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: ? mm

Vingefang: ? mm

Parring: Maj-juni

Puppetid: Ca. ? uger

Larve

Længde: ? mm

Tid: Ca. ? måneder

Føde

Dovenfluens larve er et rovdyr, som især spiser orme, snegle og mygglarver.

De voksne dovenfluere spiser ikke i de få døgn, de lever over vandet.

Vidste du det?

Dovenfluene har fået deres navn, fordi de voksne fluere er meget sløve. De sidder som regel helt stille på et strå ved bredden, og de bliver ofte siddende, selv om de forstyrres. Hunnen lægger æg på planter i vandkanten nær bredden.

Dyndflue


Latinsk navn: *Eristalis tenax*

Engelsk navn: Drone fly

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Svirrefluer



Dyndfluen er en stor svirreflue, som på grund af sine farver nemt forveksles med en han-bi, dvs. en drone, og derfor kaldes den også droneflue. Den lever især ved små vandhuller og træffes ofte i skovlysninger.

Kendetegn

Dyndfluen kendes især på sin sorte og gule bagkrop, men ser man godt efter, vil man opdage, at den har to bånd af mørke hår tværs over øjnene.

Føde

Dyndfluen lever mest af pollen og nektar fra blomster. Dyndfluens larve lever i dynd, dvs. forurenede vandhuller, hvor den spiser bakterier og rådne planter. Vi kalder dyndfluens larve for rottehale, og den er et eksempel på et dyr, der kan leve i meget forurenat og iltfattigt vand.

Fakta

Levesteder: Skoven

Størrelse: 14-16 mm

Æg: Lægges i lavt vand eller mudder

Larve: Hvidlig med langt ånderør

Længde larve: Ca. 2 cm

Ånderør: Ca. 4 cm

Vidste du det?

Dyndfluens larve, "rottehalen" viser tydeligt, hvis et vandhul er forurenat. Den trives kun hvor der er mudder, slam og rådne plantedele. Den ånder ved at stikke sit lange ånderør op gennem muddret eller vandet. Ånderøret er dobbelt så langt som selve larven.

Hvirvler


Latinsk navn: *Gyrinus marinus*

Engelsk navn: Whirlgig Beetle

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Hvirvlerne



Hvirvlerne er almindelige i vandhuller, damme, søer og rolige åløb i det meste af landet. Hvirvlerne kendes nemt, fordi de hvirvler eller cirkler rundt på vandoverfladen. Hvirvlerne ses også på vingerne hen på sensommeren og om efteråret. Larverne lever på bunden.

Kendetegn

Hvirvlerne er små ovale biller med korte antenner, fire dækvinger og seks ben. Billen er oftest sort eller metalblå med prikker på dækvingerne, der ligner længdestriber. Hvirvlerne har desuden todelte øjne. Larven er lang og uden vinger.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 5-7 mm
Vingefang: ? mm
Parring: ?
Puppetid: Et par uger
Larvelængde: 15 mm

Føde

Hvirvlerne lever af myggelarver, dafnier og andre smådyr samt af insekter, der er faldet ned i vandet og ligger i vandoverfladen.

Vidste du det?

Hvirvlerne gør både brug af de specielle todelte øjne samt de korte antenner, når de jager. Med antennerne kan de mærke vibrationerne fra og bestemme afstand og retning til et sprælende dyr. Med øjnene kan de se, hvad der sker både under og over vandoverfladen.



Kvægmyg


Latinsk navn: **Simuliidae**

Engelsk navn: **Black fly**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Tovinger**

Familie: **Kvægmyg**



Kvægmyg er almindelige overalt i Danmark. Larverne lever i åer og bække - gerne i vandløb, der er forurenet af dødt, organisk materiale. Man kan især i varmt og fugtigt vejr se tætte sværme af voksne kvægmyg omkring heste og kvæg.

Kendetegn

Kvægmyg ligner til forveksling små fluer. Bagkroppen er mørk, brystet er sort, skinnede og hvælvet. Myggen er gråhvid på undersiden. De to brede vinger er taglagte, når den er i hvile. Følehornene er ret tykke og korte.

Føde

Hunnen suger ved hjælp af sin kraftige sugesnabel blod fra kvæg, heste og mennesker. Larven lever af bakterier og andre organismer, som den filtrerer fra vandet ved brug af to vifter med fjerlignende børster.

Fakta

Levesteder:

Sø og vandløb

Længde: 1,3-4 mm

Vingefang: ? mm

Parring: ?

Puppetid: ? uger

Larvelængde:

op til 10 mm

Vidste du det?

Kvægmyggens larve er fastgjort til sten eller planter nede i vandet med et spind af tråde. Inden larven forpupper sig, spinder den et hylster, som fastgøres til under laget. Fra enden af hylsteret stritter nogle grålige gælletråde ud. Kvægmyggens puppe ligner et lille kræmmerhus.

Skorpionstæge


Latinsk navn: *Nepa cinerea*

Engelsk navn: Water Scorpion

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Skorpiontæger



Skorptionstægen lever i søer, vandhuller, damme og vandløb. Den er en dårlig svømmer, der holder til på lavt vand eller i muddret i vandkanten. Den flyver kun, hvis den er tvunget til det. Skorpionstægen er fremme fra tidlig forår til følgende vinter. Den overvintrer i vandet.

Kendetegn

Skorpionstægen er en gråbrun, bred og flad vandtæge. Forbenene er kraftige og kloagtige - ligesom en skorpions. Skorpionstægen har et tyndt ånderør på 10-12 mm samt fire dækvinger. Nymfen er lysere med et kortere ånderør og uden vinger.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 18-22 mm (uden ånderør)
Bredde: 10 mm
Parring: forår-forsommer
Nymfetid: 1-3 mdr.
Nymfelængde: ?

Føde

Skorpionstægen fanger snegle, krebsdyr, insekter og endda små fisk ved hjælp af forbenene.

Vidste du det?

Skorpionstægen har som andre vandtæger en sugesnabel, der bruges til at opløse og udsuge byttedyr. Hvis man tager en skorpions-tæge op i hånden, vil man dog også kunne opleve, at insektet kan bruge sugesnablen til at stikke med!

Skovmyg


Latinsk navn: *Aedes communis*

Engelsk navn: Mosquito

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Stikmyg



Skovmyggen er meget almindelige i skove og krat, hvor de yngler i små vandhuller, vandpytter og grøfter.

Kendetegn

Skovmyggene kendes især på deres summelyd. Hunnen har en lang stiksnabel. Hannen har fjerformede antenner. Skovmyggens larver findes om foråret i de fleste småsøer og vandhuller, hvor de "hænger" med deres ånderør stukket op gennem vandoverfladen.

Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
Størrelse: Ca. 7 mm
Parring: Maj-august
Æg: Overvintrer i udtørrede vandpytter
Larvetid: 5-8 uger
Puppetid: 3-4 dage

Føde

Skovmyggene lever af nektar fra blomsterplanter. Men hunnen har brug for blod fra pattedyr eller mennesker, hvis æggene skal udvikles bedst muligt. Derfor er det kun hunnen, der stikker og suger blod. Den kan til gengæld stikke og suge et blodmåltid til sig op til 20 gange i sin levetid.

Vidste du det?

Når hunmyggen stikker, sprøjter den en væske ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Det er denne væske, som giver kløende myggestik. Hvis man lader myggen suge blod i fred, vil den suge det meste af væsken op sammen med blodet.

Stavtæge


Latinsk navn: *Ranatra linearis*

Engelsk navn: Water stick insect

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Skorpiontæger



Stavtægen er almindelig udbredt i det meste af landet. Den lever i vandhuller eller damme med en kraftig plantevækst, som kan skjule den, når den er på udkig efter føde. Stavtægen er en god svømmer, der gerne bevæger sig ud på dybt vand. Den overvintrer i vandet.

Kendetegn

Stavtægen har en meget tynd og langstrakt brungul krop. Den har et tyndt, spidst ånderør på 35 mm, fire vinger og seks ben, hvoraf de to forreste er gribeben. Stavtægen kaldes for "vandets vandrende pind."

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: ca. 70 mm (med ånderør)
Vingefang: ? mm
Parring: ?
Nymfetid: ?
Nymfelængde: Op til 60 mm

Føde

Stavtægen fanger blandt andet bugs-vømmere og skøjte-løbere, som udsuges med sugesnablen.

Vidste du det?

Stavtægehunnen borer sine æg ind i vandplanter. Hvert æg er forsynet med to lange, hvide tråde, som stritter ud af vandplanten. Derfor kan æggene tydeligt ses. Æggene klækkes hurtigt, og nymferne kan ses allerede fra juni.

Stor bugsvømmer


Latinsk navn: *Corixa punctata*

Engelsk navn: Water boatman

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Skorpiontæger



Stor bugsvømmer er en af vore almindeligste bugsømmere. Den lever på bunden i åer, vandløb, søer, damme, moser og vandhuller - gerne med mange vandplanter. Insektet kan flyve rigtig langt efter nye levesteder. Stor bugsvømmer overvintrer i muddret på bunden og kommer frem igen når vandtemperaturen stiger.

Kendetegn

Stor bugsvømmer har et lyst og bredt hoved med store rødbrune øjne. Forkroppen er mørk med lyse længdestriber. Dækvingerne er mørke med små gullige pletter. Dens krop er oval og flad. Bugsvømmeren har desuden en kort og bred sugesnabel.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 13-15 mm
Vingefang: ? mm
Parring: forår
Nymetid: 3-4 uger
Nymfelængde: ? mm

Føde

Stor bugsvømmer udsuger især alger og halvrådnede planter samt ådsler.

Vidste du det?

Stor bugsvømmer er dækket af et lag af vandskyende hår, som danner en slags lufthinde omkring den. Det fungerer næsten som en iltbeholder. Det betyder at bugsvømmeren kun sjældent skal op til overfladen for at hente ny luft.

Stor døgnflue

Latinsk navn: *Ephemera danica*

Engelsk navn: Mayfly

Klasse: Insekter

Orden: Døgnfluer

Familie: Ephemera



Stor døgnflue er almindelig i Danmark. Den kendes også under navnet majflue. Nymferne lever bl.a. i åer, små vandløb og søer. Stor døgnflue er fremme forår-sommer. Den ses især på varme dage i maj og juni. Den enkelte døgnflue lever kun ganske kort tid.

Kendetegn

Stor døgnflue er en af de største danske døgnfluer. Kroppen er langstrakt og hvid med mørke pletter. Forvingerne er store og trekantede med et gult skær. Bagvingerne og antennerne er meget små. På bagkroppen har døgnfluen tre meget lange og tynde haletråde. Hunnen er større end hannen.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: op til 25 mm
Vingefang: ca. 40 mm
Parring: ?
Nymfetid: ca. 2 år

Føde

Stor døgnflue tager som voksen ikke føde til sig. Nymfen lever af alger samt halvrådne plantedele.

Vidste du det?

Nymferne lever nedgravet i bunden i ca. 2 år. Herefter kommer de op til overfladen og kravler ud af huden. Nymfen er dog endnu ikke helt voksen, men gennemgår endnu et stadie. Først efter et døgn er døgnfluen helt udviklet.

Stor slørvinge


Latinsk navn: *Perlodes microcephala*

Engelsk navn: Large Stonefly

Klasse: Insekter

Orden: Slørvinger

Familie: Perlodes



Stor slørvinge er sjælden i Danmark. Den findes kun i få jyske vandløb. Slørvinger lever kun i rent og ilttrigt vand uden organisk forurening. Nymfen lever på bunden. Den voksne slørvinge lever kun 2-3 uger og kan ses i april-maj.

Kendetegn

Stor slørvinge er et aflangt og mørkebrunt insekt. De fire vinger er smalle og holdes i hvile fladt over ryggen. Følehornene er lange og tynde, ligesom de to haletråde. Nymfen har ingen vinger, men ligner ellers den voksne slørvinge. Nymfen har ligeledes 2 halenokker.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde (han): 8-11 mm
Længde (hun): 15-17 mm
Vingefang (han): 18-25 mm
Vingefang (hun): 35-40 mm
Antal æg: ca. 200
Nymfetid: ca. 1 år

Føde

Stor slørvinge tager som voksen ikke føde til sig. Nymfen æder til gengæld andre vandinsekter og deres larver.

Vidste du det?

Stor slørvinge er ikke en god flyver - og hannen kan slet ikke flyve. Hunnens vinger dækker hele bagkroppen i modsætning til hannens noget kortere vinger. Hvis man finder slørvingenymfen, kan man være ret sikker på, at vandløbet, hvor den lever, er rent.

Stor spiralvårflue


Latinsk navn: *Phryganea grandis*

Engelsk navn: Caddisfly

Klasse: Insekter

Orden: Vårfluer

Familie: *Phryganea*



Stor spiralvårflue er almindeligt udbredt i Danmark. Den lever ved søer, vandhuller og rolige vandløb - gerne med mange vandplanter. Den voksne vårflue skjuler sig om dagen og er mere aktiv om natten, hvor man kan tiltrække den med lys. Stor spiralvårflue flyver i juni-august.

Kendetegn

Stor spiralvårflue er gråbrun med lyse og mørke tegninger på krop og forvinger. Bagvingerne er lysere end resten af insektet med et gult skær. Følehornene er meget lange og tynde. Hunnen er desuden normalt lidt større end hannen.

Føde

Den voksne store spiralvårflue lever kun kort tid og tager derfor kun begrænset føde. Den kan fx suge dug og nektar med sin korte snabel.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 15-25 mm
Vingefang: 40-60 mm
Parring: ?
Puppetid: ca. 2 uger
Larvelængde: ca. 40 mm
(uden hus)

Vidste du det?

Stor spiralvårflues larve bygger lange og spiralformede huse af vandplanter, som de lever i (Se larve). Larven er et rovdyr, der æder både små og store dy, der lever i vandet

Stor vandkalv


Latinsk navn: *Dytiscus marginalis*

Engelsk navn: Meadow Spittlebug

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Vandkalve



Stor vandkalv er almindeligt udbredt i Danmark. Den lever i stille eller rolige småsøer, damme og vandhuller. Billen lever i vandet, men den er nødt til at komme op til overfladen for at få luft. Luften opbevares i en luftlomme, der sidder under dækvingerne. Hunnen lægger æg om foråret.

Kendetegn

Stor vandkalv er en blank, oval bille. Den er mørk med et grønligt skær og gule striber langs hver side og på hovedet. Hunnen kan have rillede dækvinger og den er lidt mindre end hannen. Benene er gulbrune.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 27-32 mm
Vingefang: ? mm
Parring: ?
Antal æg: 200
Puppetid: 1-2 uger
Larvelængde: op til 60 mm

Føde

Både stor vandkalv og larven lever af orme, snegle, insekt-larver, haletudser, småfisk og små frøer.

Vidste du det?

Stor vandkalv lever i vandet, men den er også en ganske god flyver. Billen flyver mest om natten, hvor den kan foretage længere ture væk fra vandhullet eller søen.

Tidlig tvegælleddøgnflue


Latinsk navn: *Leptophlebia marginata*

Engelsk navn: Mayfly

Klasse: Insekter

Orden: Døgnfluer

Familie: Leptophlebia



Tidlig tvegælleddøgnflue er en af Danmarks mest almindelige døgnfluer. Den lever i mindre vandhuller og damme med mange vandplanter. Den findes også i rolige vandløb. Tidlig tvegælleddøgnflue ses maj-juni. Den lever kun få dage.

Kendetegn

Tidlig tvegælleddøgnflue er sort på hovedet og forkroppen. Bagkroppen er også sort men med lyse ringe. Forvingerne er store og mørkest øverst. Bagvingerne er små og helt klare. Desuden har døgnfluen korte følehorn og tre lange haletråde bagest. Hannen har lange fremstrakte forben.

Føde

Den voksne døgnflue tager ikke føde til sig. Nymfen æder alger og rådende plantedele.

Fakta

Levesteder:

Sø og vandløb

Længde: ? mm

Vingefang: 25-28 mm

Parring: ?

Nymfetid: op til 1 år

Nymfelængde: op til 12 mm

Vidste du det?

Nymfen lever på bunden i ca. 1 år, hvorefter den kommer op af vandet. Den er dog endnu ikke helt udviklet men gennemgår endnu et stadie, som varer et par timer. Derefter er den en voksen døgnflue.

Vandkær

Latinsk navn: *Hydrophilus piceus*

Engelsk navn: Water Scavenger

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Vandkærer



Vandkæren findes spredt i størstedelen af Danmark, hvor den lever i mindre vandhuller med rent vand og mange planter.

Kendetegn

Vandkær er en stor og kraftig bille. Kroppen er blank og sort med et grønligt skær. Billen har seks ben og fire dækvinger. Vandkærens følehorn er rødgule.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: 34-47 mm.

Vingefang: ? mm.

Parring: ?

Puppetid: ?

Larvelængde: 60 mm.

Føde

Vandkæren lever af planteføde, mens larverne er rovdyr, der æder snegle og andre vandlevende smådyr.

Vidste du det?

Stor vandkær er Danmarks næststørste bille.

Vandmyreløve

Latinsk navn: *Osmylus fulvicephalus*

Engelsk navn: Giant Lacewing

Klasse: Insekter

Orden: Netvinger

Familie: Vandmyreløver



Vandmyreløven forekommer især i Jylland ved vandløb, åer og bække med rent vand. Der skal være træer, buske eller anden plantevækst langs bredden, som kan give vandmyreløven skygge. Vandmyreløverne skjuler sig om dagen på grene og blade.

Kendetegn

Vandmyreløven er en stor netvinge med en aflang og spinkel sort krop. Hovedet er rødt eller rødbrunt. Vandmyreløven har store, brede vinger, som er glasklare med mørke pletter. Den har lange og tynde følehorn. Larven er lang og mørkebrun.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: ? mm
Vingefang: 42-50 mm
Parring: ?
Antal æg: 25
Puppetid: 2-3 uger
Larvelængde: op til 20 mm

Føde

Vandmyreløven lever især af små insekter samt alger. Larven æder også små insekter samt larver, snegle og orme.

Vidste du det?

Efter parringen lægger hunnen sine æg i små grupper i mosset ved vandet. Larverne overvintrer i mospuderne indtil næste forår. Larven er derfor meget vaskelig at opdage i naturen.

Vandrøver


Latinsk navn: *Ilyocoris cimicoides*

Engelsk navn: **Saucer Bug**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Næbmunde**

Familie: **Vandrøvere**



Vandrøveren er ikke særlig almindelig i Danmark men findes dog i de sydøstlige egne. Den lever i lune og solrige vandhuller, damme og moser med mange vandplanter. Vandrøveren overvintrer på bunden i de koldeste måneder, men ellers er den fremme hele året.

Kendetegn

Vandrøveren er brun med et grønligt skær. Den har 6 ben, hvoraf de 2 forreste er gribe- ben. Bagbenene er behårede og bruges til at svømme med. Vandrøveren kan også flyve.

Føde

Vandrøveren lever både af vand- insekter, snegle, orme og larver samt større dyr som haletudser, salamanderlarver og mindre fisk. Vandrøveren opløser og udsuger sit bytte med sugesnablen. Den kan også stikke mennesker!

Fakta

Levesteder:

Sø og vandløb

Længde: 12-14 mm

Vingefang: ? mm

Parring: april-maj

Nymfetid: 1-3 mdr

Nymfelængde: ?

Vidste du det?

Vandrøveren skal op til overfladen for at få luft, som den bærer på under- siden af kroppen. Vandrø- verens krop er dækket af et tyndt lag hår, hvorsmå luftbobler kan sidde fast.

Å-vårflue


Latinsk navn: *Anabolia nervosa*

Engelsk navn: Caddisfly

Klasse: Insekter

Orden: Vårfluer

Familie: Anabolia



Å-vårfluen lever især ved åer og vandløb med stille strømmende vand. Den er almindelig i hele Danmark. Larverne lever i vandløb, med vandplanter på bunden. De voksne å-vårfluer sværmer i sensommeren.

Kendetegn

Den voksne å-vårflue er ca. 3 cm lang. Kroppen og de lange antenner er mørkebrune. Forvingerne er brune, lidt lysere end kroppen. Bagvingerne er lyse og næsten gennemsigtige. Som andre vårfluer, kan å-vårfluer kendes på, at de har små hår på vingerne. Larven bygger sit hus større i takt med, at den vokser.

Føde

Larven er planteæder. Føden består af alger og forskellige vandplanter. De voksne vårfluer lever af nektar fra blomsterplanter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: Ca. 3 cm
Vingefang: 6 cm
Parring: Maj-juni
Puppetid: Ca. ? uger

Larve

Længde: 2 cm. Larvetid: ?

Vidste du det?

Selv om voksne vårfluer ligner hinanden, er deres levevis alligevel meget forskellig. Nogle vårfluelarver, som spiser planter, bygger huse af plantedele eller sten, som de lever i. Andre vårfluelarver er glubske rovdyr, som lever frit i vandet. (Se larve)