

Aftenpåfugleøje

Latinsk navn: *Smerinthus ocellata*


Engelsk navn: Eyed Hawk-moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Aftensværmere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Aftenpåfugleøje er kun fremme midt om natten, så man ser ikke den voksne sommerfugl så ofte.

Kendetegn

Forvingen er mønstret i lyse og mørke grå farver, som får sommerfuglen til at ligne et barkmønster, når den sidder sammenfoldet på en træstamme om dagen. Bagvingen har en stor blå øjeplet på orangerød baggrund.

Fakta

Levesteder: Skoven

Vingefang: 7-9 cm

Parring: Maj-juni

Æg: 150-200

Larvetid: Ca. 4 måneder

Puppetid: Overvintrer

Føde

Larven æder blade fra løvtræer, fx pil, bævre-asp, poppel, birk og frugttræer. De voksne sommerfugle tager ikke føde til sig.

Vidste du det?

Hvis en aftenpåfugleøje bliver skræmt, hæver den forvingerne, så man tydeligt ser øjepletterne på bagvingerne. Øjepletterne er en del af sommerfuglens forsvar, idet den kan forskrække en rov-fugl ved at vise øjnene og så nå at flygte bort.

Æblevikler

Latinsk navn: *Cydia pomonella*

Engelsk navn: Codling Moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Viklere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Æblevikleren er en meget lille sommerfugl eller møl, som mange vil kalde den. Selve den voksne æblevikler er ikke særlig kendt på grund af den lille størrelse, men larven ses ofte, fordi den graver gange i æbler. Det er som regel æbleviklerens larve, vi betragter som "orm" i æblerne. I løvskovene lever larverne af skovæbler.

Kendetegn

Æbleviklerens forvinger er gråbrune med lyse og mørke linjer tværs over. Bagvingerne er lysebrune. Når æblevikleren hviler, ligger vingerne på højkant hen over kroppen.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 1,5-2 cm
Parring: Juni-juli
Æg: 50-80
Larvetid: Overvintrer
Puppetid: Ca. 4 uger

Føde

De voksne æbleviklere lever af nektar, men larverne graver gange i æbler ind til kernehuset, hvor de æder af kernerne.

Vidste du det?

Æblevikleren betragtes som et skadedyr i frugtplantager. Der kan være så mange æbleviklere i en plantage, at æblehøsten er truet, og så sprøjtes ofte med insektgift. Der findes dog også andre metoder, hvor man lokker de voksne æbleviklere til fælder.



Birkemåler

Latinsk navn: *Biston betularia*


Engelsk navn: **Peppered Moth**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Målere**

Gruppe: **Natsommerfugle** (C)



Birkemåleren er en almindelig sommerfugl i hele Danmark. Den findes i skove og krat, hvor der vokser løvtræer, men den ses også i byerne, hvor larverne holder til i parker og grønne områder.

Kendetegn

Birkemåleren er et stor måler. Den findes i to former, en hvid med små mørke aftegninger og en sort. Hannen og hunnen er ens. Birkemålerens larver er lange og meget tynde. Når de er strukket ud, kan de være op til 6 cm lange. Når de sidder helt stille, kan de ligne en lille kvist.

Fakta

Levesteder: Skoven

Vingefang: 4,5-6 cm

Parring: Maj-juli

Larvetid: 2-3 måneder

Puppetid: Overvintrer

Føde

De voksne birkemålere lever af nektar. Larverne lever af blade fra løvtræer og buske. De træffes især på birk, eg, bøg, roser og hindbær. Larverne æder kun om natten.

Vidste du det?

Birkemålerne bruger deres farve som kamuflage. Når en hvid birkemåler sidder på en birkestamme, kan man næsten ikke se den. Der er fleste hvide birkemålere, fordi fuglene, som spiser dem, lettest får øje på de sorte birkemålere.



Blodplet

Latinsk navn: *Tyria jacobaea*


Engelsk navn: Cinnabar Moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Uglefamilien

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Blodplet er ret almindelig og udbredt i det meste af Danmark. Sommerfuglen lever på tørre marker, brakmarker, enge, heder, overdrev og i åbne skovlysninger. Blodplet flyver sent på natten, men man kan se den om dagen, hvis man skræmmer den op.

Kendetegn

Blodplet har en sort krop, mørke forvinger med en smal, rød streg langs forkanten af vingen og to røde pletter. Sommerfuglen har røde bagvinger med en smal mørk kant. Larven er sort og gul.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 32-49 mm

Flyvetid: Maj-juni

Overvintrer som puppe

Føde

Den voksne blodplet suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af blade og blomster fra engbrandbæger og vandbrandbæger.

Vidste du det?

Engbrandbæger er en giftig plante, men giften er ikke farlig for larver af blodplet. Larverne optager nemlig giften, så larverne selv bliver giftige. Larvernes sorte og gule advarselsfarver viser, at larverne er giftige. De voksne sommerfugle er også giftige. De har røde og sorte advarselsfarver.

Brun bjørn

Latinsk navn: *Arctica caja*

Engelsk navn: Garden Tiger

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Bjørnespindere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Brun bjørn kaldes også brun bjørnespinder. Den er udbredt i hele Danmark, men man ser den ikke flyve så ofte, fordi det er en natsommerfugl. Om morgenen kan man ofte finde brun bjørn siddende i græsset, hvor den hviler sig.

Kendetegn

Forvingerne er hvide med store mørke pletter. Bagvingerne er røde med blåsorte pletter. Hannen og hunnen er ens. Larven kendes på de meget lange brunlige hår overalt på kroppen

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 5-8 cm
Parring: Juli-august
Æg: 600-1.000
Larvetid: Ca. 3 måneder
Puppetid: Overvintrer

Føde

De voksne sommerfugle lever af nektar. Larverne spiser blade fra en lang række planter, og de tilpasser sig hurtigt de planter, som findes i nærheden af, hvor æggene er lagt.


Vidste du det?

Hvis man finder en larve fra brun bjørn og tager den med hjem, kan man få den til at spise forskellige slags planter. Der er eksempler på, at larverne har levet af kaktusplanter i vindueskarmen, fordi der ikke var anden føde.



Duehale

Latinsk navn: *Macroglossum stellatarum*
Engelsk navn: Humming-bird Hawk-moth
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Aftensværmere
Gruppe: Natsommerfugle ☾



Duehale er en sjælden sommerfugl i Danmark. Den besøger landet om sommeren og kan i nogle år optræde i store antal. Duehale findes i områder med snerre og vilde blomster. Sommeffuglen ses på skrænter, marker, enge og i haver.

Kendetegn

Duehalen har en bred, tyk krop. Brystet er loddent, og bagkroppen er brun med hvide pletter og pels. Duehalen har gråbrune forvinger og orange bagvinger. Larverne er grønne eller rødbrune med hvidgule striber og rødlig pletter.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 50-58 mm
Kan ses: Maj-oktober
Larvelængde: 45-50 mm
Larvetid: omkring 20 dage
Puppetid: 4 uger

Føde

Den voksne sommerfugl suger nektar i blomster. Larverne lever af planten snerre.


Vidste du det?

Duehalen er en natsommerfugl, men den flyver om dagen. Duehale svæver i luften, når de suger nektar fra blomster med deres lange sugesnabel.



Dueurtsværmer

Latinsk navn: *Deilephila elpenor*
Engelsk navn: Elephant Hawk-moth
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Aftensværmere
Gruppe: Natsommerfugle ☾



Dueurtsværmeren er en af de mest almindelige aftensværmere i Danmark. Den findes både i skovlysninger, skovbryn og i det åbne land.

Kendetegn

Dueurtsværmren kendes især på sin meget lyse røde farve. Larven er grøn, brun eller sort med tydelige store øjepletter. Bagest på kroppen har den et krumt "horn". Hvis larven forskrækkes, kan den trække hovedet ind i forkroppen, så den svulmer op. Øjepletterne bliver store, og den er sikkert i stand til at skræmme nogle rovfugle bort.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 6-7 cm
Parring: Maj-august
Æg: 150-200
Larvetid: Ca. 3 måneder
Puppetid: Overvintrer

Føde

De voksne dueurtsværmere lever af nektar. Larverne har givet sommerfuglen sit navn, fordi de især lever på dueurt. Men de spiser også gederams og andre urter.

Vidste du det?

Dueurtsværmeren er meget dygtig flyver. Nogle sammenligner den med en kolobri, fordi den kan stå helt stille i luften med hurtige vingeslag, mens den suger nektar fra en blomst.



Gammaugle

Latinsk navn: *Autographa gamma*


Engelsk navn: Silver Y

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Uglefamilien

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Gammauglen er udbredt og almindelig som træksommerfugl i hele landet. Den lever i åbne, blomsterrige områder på enge, marker, overdrev, i åbne skove og i haver. Voksne gammaugler er aktive både om dagen og natten. Larven er kun aktiv om natten. Gammaugler kan normalt ikke overvintre i Danmark, men hver sommer kommer der dyr hertil fra Sydeuropa og Nordafrika.

Kendetegn

Gammaugle har en bred, lodden krop og er mønstret i gråbrun eller violetgrå med et skinnende, sølvhvidt Y eller det græske tegn gamma på hver forvinge. Larven er grøn med gullige striber.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 32-43 mm
Kan ses: Juli-september
2 eller 3 generationer om året
Larvelængde: 40-45 mm
Larvetid: Omkring 1 måned
Puppetid: 2 uger

Føde

Voksne gammaugler suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af lavtvoksende planter som stor nælde, brombær, kløver, kål, bønner og andre bælgplanter.

Vidste du det?

I nogle år er gammauglen meget talrig i Danmark. I såkaldte invasionsår ser man ofte sommerfuglen i løbet af sommeren eller sensommeren.



Grøn birkemåler

Latinsk navn: *Geometra papilinaria*


Engelsk navn: Large Emerald

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Målere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Grøn birkemåler træffes i hele Danmark, først og fremmest i løvskove, langs skovbryn og i parker og haver.

Kendetegn

Grøn birkemåler er den støste grønne måler, der lever i Danmark. Vingerne er grønne med svagt synlige hvide linjer. Han og hun er ens. Larven har hård hud, og kroppen er gulgrøn med røde vorter på ryggen.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 4,5-5 cm
Parring: Juni-august
Larvetid: Overvintrer
Puppetid: Ca. 4 uger

Føde

De voksne grønne birkemålere lever af pollen og nektar fra mange forskellige planter. Larverne æder især blade fra birk, bøg, el, pil og hassel.

Vidste du det?

Kommer snart



Guldbåndet langhornsmøl

Latinsk navn: *Nemophora degeerella*


Engelsk navn: Longhorn Moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Adelidae

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Guldbåndet langhornsmøl er almindelig i hele Danmark. Den træffes især i løvskove, hvor man ofte kan se små sværme af dem.

Kendetegn

Guldbåndet langhornsmøl kendes især på sine meget lange antenner, som kan være 4-5 gange længere end selve kroppen. Vingerne er lysebrune eller gullige med to mørke bånd trærs over. Mellem de mørke bånd er et gyldend bånd, som har givet den lille sommerfugl sit navn.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 1,5-2 cm
Parring: Maj-juni
Larvetid: Overvintrer
Puppetid: Ca. 2 uger

Føde

Larverne lever af blade fra forskellige løvtræer. De voksne langhornsmøl lever sandsynligvis mest af nektar.

Vidste du det?

På varme sommerdage kan man opleve hannerne "danse" i luften. Måske bruger de deres lange antenner til at holde balancen med.

Harlekin

Latinsk navn: *Calospilos sylvata*


Engelsk navn: **Magpie**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Målere**

Gruppe: **Natsommerfugle** ☾



Harlekin er en almindelig og let genkendelig natsommerfugl. Den er udbredt i hele Danmark. Man ser af og til harlekin-sommerfuglen om dagen, hvis den forstyrres og jages op fra en busk, hvor den hviler.

Kendetegn

Harlekin-sommerfuglen er let genkendelig på forvingernes hvide farve med mange sorte pletter og et brunligt, orange eller gult bånd. Bagvingerne er helt hvide med sorte pletter. Han og hun er ens.

Føde

De voksne sommerfugle lever af nektar. Larven lever af blade fra småbuske, især stikkelsbærbuske.

Derfor kaldes larven også for "stikkelsbærmåler".

Larverne er meget grådige og kan anrette stor skade i gartnerier og haver.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 3,5-4,5 cm
Parring: Juli-august
Larvetid: Overvintrer
Puppetid: Ca. 6 uger

Vidste du det?

Harlekin-sommerfuglenes larver betragtes som skadedyr, fordi de ofte vælger bærbuske, fx stikkelsbær, solbær og ribs som deres foretrukne føde. Larverne bekæmpes af og til med insektgift, hvis et gartneri eller en frugtplan-tage er udsat for et stort angreb.

Have-græsmøl

Latinsk navn: *Chrysoteuchia culmella*


Engelsk navn: Garden Grass-veneer

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Græsmøl

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Have-græsmøl er meget almindelig og udbredt i Danmark på græsplæner, henge og marker med højt græs. Voksne græsmøl sværmer om natten og i skumringen. Den hviler om dagen mellem græsstrå.

Kendetegn

Have-græsmølet er et stort møl med hvide eller lysegule vinger, mørke ribber og en vinkel-tegning yderst på forvingen. Græsmøl har lange, fremadrettede palper og en sugesnabel. Larven er grågul med brunt hoved.

Føde

Voksne græsmøl æder ikke, men larverne æder græsrødder og andre plantedele. Larverne kan derfor gøre stor skade på marker og græsplæner.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 18-24 mm

Flyvetid og parring:

Juni-juli

Larvelængde: 15 mm

Puppetid: 1-2 uger

Vidste du det?

Larverne af græsmøl bor i små rør dannet af jordpartikler. Larverne overvintrer i deres rør og forpupper sig, når det bliver sommer igen.



Hermelinskåbe

Latinsk navn: *Cerura vinula*


Engelsk navn: Puss Moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Tandspindere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Hermelinskåben er udbredt i hele landet. Den er dog mest almindelig i Jylland. Sommerfuglen lever på heder, marker, overdrev og i klitter, skove og haver. Hermelinskåbe er en natsommerfugl, der kun er aktiv om natten. Man kan tiltrække den med lys.

Kendetegn

Hermelinskåben er en stor tandspinder med en tyk, lådden krop. Den har grå-hvide vinger med sort mønster. Hannen har fjeragtige antenner, og hunnen har trådformede antenner.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 58-80 mm
Flyvetid: Maj-juli
Larvelængde: 80 mm
Overvintrer som puppe

Føde

Den voksne hermelinskåbe æder slet ikke.

Vidste du det?

Larven af hermelinskåbe er grøn med sort ryg og oppustet forende med sort og rødligt ansigt. Den har en lang gaffelformet hale, hvorfor larven kaldes en "gaffelhale". Larven lever på træer og æder blade.



Ligustersværmer

Latinsk navn: *Sphinx ligustri*


Engelsk navn: Privet Hawk-moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Aftensværmere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Ligustersværmeren er en af vore største sommerfugle. Den voksne sommerfugl ses fra maj til midt i juli.

Kendetegn

Forreste del af kroppen er sort, og bagkroppen er rød med seks sorte tværstriber. Farverne fra kroppen gentages lidt svagere på vingerne. Forvingerne er store og tilspidsede, mens bagvingerne er meget små.

Føde

Ligustersværmeren har fået sit navn, fordi larven ofte lever på buske som liguster og syrener. Larven er meget almindelig i hække og hegn. Den voksne ligustersværmer lever af nektar, som den bl.a. finder i kaprifolier.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 10-12 cm
Parring: Juni-juli
Æg: 150-200
Larvetid: Ca. 3 måneder
Puppetid: Overvintrer

Vidste du det?

Ligustersværmeren flyver mest om natten, hvor den holder af at suge nektar fra kaprifolier. Om dagen hviler den sig – ofte på en stamme tæt ved jorden. Den kan være vanskelig at få øje på, fordi den ligner en udvækst på træets bark.



Lille frostmåler

Latinsk navn: *Operopthera brumata*


Engelsk navn: Winter Moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Målere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Lille frostmåler er en af Danmarks mest almindelige sommerfugle. Den ses hele sommeren og flyver ofte til hen i december. Normalt flyver lille frostmåler om natten. Den tiltrækkes af lys, og man ser den ofte søge mod gadelygter og tændte billygter.

Kendetegn

Lille frostmåler kendes især på hannens gråbrune forvinger med bølgede striber. Hunnen har meget små vinger, og den kan ikke flyve. Larven er grøn med lyse striber på langs.

Fakta

Levesteder: Skoven

Vingefang (han):

2,5-3 cm

Vingefang (hun):

0,6-0,8 cm

Parring:

Oktober-december

Æg: 300-400

Larvetid: Ca. 3 mdr

Puppetid: 2-3 mdr

Føde

Larven lever af blade fra alle slags løvtræer, og der kan være så mange frostmålere i et område, at larverne næsten spiser alle bladene fra træerne. Hvis lille frostmåler slår sig ned i frugtplantager, kan larverne gøre stor skade. Den voksne frostmåler tager ikke føde til sig.

Vidste du det?

Lille frostmåler kommer frem fra pupperne i oktober-november. Hunnen sidder på en træstamme og venter på en han, som hun kan parre sig med. Derefter lægger hun sine æg i revner i træets bark. Æggene klækkes næste forår, når der er blade på træerne.



Metalvinge

Latinsk navn: *Adscita statices*


Engelsk navn: Forester

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Køllesværmere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Metalvinge kaldes også for grøn køllesværmer. Sommerfuglen lever på overdrev, heder, brakmarker, enge og i skovlysninger. Metalvingen er almindelig i Jylland, men findes kun spredt i resten af landet.

Kendetegn

Metalvinge er en lille sommerfugl med metalskinnende, mørkegrønne forvinger. Larverne er gule eller lysegrønne med rødbrune striber på siden og sorte pletter.

Føde

De voksne sommerfugle suger nektar i mange forskellige blomster. Larverne lever af blade fra planten rødknæ og andre syre-planter.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 24-32 mm
Flyvetid: Juni-juli
Larvelængde: Ca. 12 mm
Overvintrer som larve
Puppetid: Ca. 2-4 uger

Vidste du det?

Selvom metalvinge er en natsommerfugl, flyver den om dagen. Sommerfuglen er oftest fremme i varmt og solrigt vejr.



Snerresværmere

Latinsk navn: *Hyles galii*


Engelsk navn: Bedstraw Hawk-moth

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Aftensværmere

Gruppe: Natsommerfugle ☾



Snerresværmere er udbredt i det meste af Danmark, men varierer fra sjælden til ret almindelig. Den lever i skovlysninger og klitter. Snerresværmere er aktive om aften, natten og i skumringen.

Kendetegn

Snerresværmere har en bred, kraftig krop og smalle vinger. Forvingerne er brune med et lyst midterbånd, og bagvingerne er rødlige med en hvid plet og sorte bånd. Snerresværmeren står stille i luften på svirrende vinger, når den suger nektar i blomster.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 60-85 mm

Flyvetid: Maj-september

1-2 generationer

Overvintrer som puppe

Føde

Som andre sommerfugle suger snerresværmere nektar i mange forskellige blomster med en lang sugesnabel. Larven lever af blade og blomster fra gede-rams og gul snerre.

Vidste du det?

Larven af snerresværmere er mørkegrøn med gule pletter omgivet af sorte kanter, en gul stribe på ryggen og et rødt horn bagerst på kroppen. Larverne er godt kamuflerede på gede-rams og snerre.